



कृषि दिनदर्शिका २०२४



वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



प्रकाशक



डॉ. डी. एन. गोखले

संचालक, विस्तार शिक्षण
वनामकृषि, परभणी

मार्गदर्शक



डॉ. इन्द्र मणि

मा. कुलगुरु
वनामकृषि, परभणी

संपादक



डॉ. राजेश कदम

विभाग प्रमुख, कृषि विस्तार शिक्षण
वनामकृषि, परभणी

संपादक सहाय्य : **श्री. राहुल सु. औंधकर** (वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक, वनामकृषि, परभणी)

किंमत : रु ६०/-

कृषि माहिती वाहिनी: (०२४५२) २२९००० ई-मेल: deevnmkv@gmail.com, फोन: (०२४५२) २२८६०१

विद्यापीठ संकेत स्थळ: www.vnmkv.ac.in विद्यापीठाच्या बातम्यांसाठी पहा www.promkvparbhani.blogspot.com



blogpost



Follow us on: @vnmkv

मराठवाडा विभागातील कृषी विकासात वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे योगदान

कोरोना विषाणु रोगाच्या प्रादुर्भाव व लॉकडाऊन मध्ये संपूर्ण जग थांबले होते, अनेक व्यापार, व्यवसाय व कारखाने बंद झाली. परंतु शेती व शेतकरी कोटोच थांबला नाही. या परिस्थितीही देशात अन्नधान्यह, भाजीपाला, फळे, दुध आदींचा तुटवडा झाला नाही की भाववाढ झाली नाही, याचे श्रेय निश्चितच देशातील शेतकरी बांधवांना जाते. यासंकटात मानवी जीवनात शेतीचे महत्त्व अधोरेखित झाले. शेती हा भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य घटक असून शेतकरी हा समाजाकरिता देवा समान आहे, म्हणून 'शेतकरी देवो भवः' मानून सर्वांनी कार्य केले पाहिजे. शेती आणि शेतकरी कल्याणाचे उद्दीष्ट ठेवून कृषि विद्यापीठ, शासन, अशासकीय संस्था, कृषि निगमदी कंपनी आणि शेतकरी यांच्यातील बंध अधिक दृढ झाले पाहिजेत. शासनाचे धोरण, कृषि तंत्रज्ञान व शेतकरी बांधवांचे अविरत परिश्रमाने देशात हरितक्रांती झाली. सन १९५०-५१ ची तुलना करता देशाचे अन्नधान्य उत्पादनात पाचवट वाढ झाली असून फळ व भाजीपाला उत्पादनात दहापट, दुध उत्पादनात दहापट, मत्स्य उत्पादनात सोळापट तर अंडी उत्पादनात पन्नास टापाईश जास्त वाढ झाली आहे. आज भारत अन्नधान्यात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर तर फळे, भाजीपाला व दुध उत्पादनात जगात पहिला आहे. आजच्या शेतीची वाटचाल जागतिकीकरणामुळे सुरू आहे. धान्य, तेलबिया, फळे, फुले व मसाले, भाजीपाला, दुधजन्य पदार्थ आदी कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीची अमर्याद क्षमता भारताकडे आहे. भारतात फळे, भाजीपाला यांची प्रक्रिया उद्योगाला मोठा वाव असून या क्षेत्रात निर्यात उद्योगाला मोठ्या संधी आहेत. कृषि क्षेत्रात नौकरी व स्वयंरोजगाराच्या संधी उल्लेख्य आहेत.

मराठवाड्यातील बहुतांश शेती कोरडवाहू असून नवत्येक हवामानामुळे शेती क्षेत्रावर मोठा परिणाम होत आहे. कोरडवाहू शेती संबंधीचे तंत्रज्ञान विकसित करून त्याचा प्रचार व प्रसार करणे, या माध्यमातून कृषि उत्पादनात स्थिर व शाश्वतता आणता येऊ शकते. या अनुषंगाने वैज्ञानिक दृष्टीकोन ठेवून तंत्रज्ञान निर्मिती, त्याचा प्रचार व प्रसार आणि प्रत्यक्ष वापर करणे, कृषि उत्पादन वाढ घडवून त्यातील सातत्य टिकविणे, या प्रमुख उद्दीष्टासाठी संपूर्ण देशपातळीवरच सत्तःच्या दशकात कृषि विद्यापीठ आणि कृषि संशोधन संस्थांचे जाळे निर्माण केले गेले. महाराष्ट्र राज्यातील कृषि विषयक व हवामान विषयक गरजा लक्षात घेऊन व त्या त्या विभागातील लोकांच्या आकांक्षेच प्रतिक म्हणून १९६८ ते १९७२ च्या दरम्यान विभागनिहाय चार कृषि विद्यापीठे स्थापन झाली. परभणी येथे १८ मे १९७२ रोजी मराठवाडा कृषि विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. हरित क्रांतीचे प्रणेते स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त यांचे राज्यातील कृषि क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानाबद्दल १ जुलै २०१३ रोजी विद्यापीठाच्या नामविस्तार वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ असा करण्यात आला. २०२१ ते २०२२ हे वर्ष विद्यापीठाचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष म्हणून साजरा करण्यात आले. मराठवाडा विभागातील कृषि विकासाकरिता परभणी कृषि विद्यापीठ कृषि शिक्षण, संशोधन व विस्तार शिक्षण या तीन मुख्य भुमिकेतून कार्य करते.

कृषि शिक्षणाच्या माध्यमातून कुशल मनुष्याबळ निर्मिती

आजपर्यंत विद्यापीठाच्या कृषि शिक्षणाच्या माध्यमातून हजारो कुशल मनुष्यबळ निर्माण केले असून कृषिचे विद्यार्थी व विविध क्षेत्रात कार्य करतांना शेती व शेतकरी विकासासाठी हातभार लावत आहेत. १९६६ साली परभणी येथे कृषि महाविद्यालयाच्या स्थापनेने सुरुवात होऊन आज विद्यापीठांतर्गत १२ घटक व ४३ संलग्नक महाविद्यालये आहेत. ५९तेच नवीन चार शासन अनुदानित घटक महाविद्यालये स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. एकुण ६ घटक व ५५ खाजगी कृषि तंत्र विद्यालये आहेत, याद्वारे विद्यार्थ्यांना कृषि विषयक शिक्षण देण्यात येते. विद्यापीठामध्ये कृषि, उद्यानविद्या, कृषि अभियांत्रिकी, सामुदायिक विज्ञान, अन्नतंत्रज्ञान, कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन यात दोन वर्षांचा पदव्युत्तर तर आचार्य पदवी कार्यक्रम कृषि शाखेच्या २३ विषयात, अन्नतंत्रज्ञान शाखेत पाच विषय, कृषि अभियांत्रिकी शाखेतील चार विषयात व सामुदायिक विज्ञान शाखेत एका विषयात राबविण्यात येतो. सन २०१७ पासून कृषि विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात बदल करण्यात आला असून कृषि पदवीधारांमध्ये कृषि उद्योगातील बीज ऊजविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार कृषी अभ्यासक्रमात बदल करण्याचे कार्य प्रगतीपथावर आहे. कृषि क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या देशविदेशातील नामांकित संस्थेच्या माध्यमातून विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासाकरिता आणि संशोधनास चालना देण्याकरिता विद्यापीठ प्रयत्नशील आहे. राष्ट्रीय उच्च कृषि शिक्षण प्रकल्पाच्या माध्यमातून सन २०२२-२०२३ मध्ये ५५ विद्यार्थी आणि २५ प्राध्यापक वर्ग यांना जगातील अग्रगण्य विद्यापीठातून प्रशिक्षण पुर्ण केले, यात अमेरिका, स्पेन, हेरी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ब्राझील, थायलंड आदी देशातील नामांकित कृषि विद्यापीठांच्या समावेश आहे, ही विद्यापीठाकरिता एक ऐतिहासिक बाब होय. या व्यतिरिक्त देशातील आयआयटी आणि विविध अग्रगण्य संशोधन संस्थेत विद्यार्थी व प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देण्याकरिता गेल्या दिड वर्षांपासून प्रयत्न केले जात आहेत. याचा परिणाम विद्यापीठाच्या शैक्षणिक व संशोधन दर्जा सुधारणा होण्याकरिता मदत होणार आहे.

शेतकरीमिष्टकृषि संशोधनातील विद्यापीठाची वाटचाल

संशोधनाच्या आधारे विविध पिकांच्या सुमारे १४८ उन्नत वाण विकसित केले आहेत. पीक लागवड, मृद व जलसंधारण, खत व्यवस्थापन, तण व्यवस्थापन, रोग व किडी व्यवस्थापन, मशागत पध्दती, शेतमाल प्रक्रिया आदी विषयांच्या १००५ तंत्रज्ञान शिफारशी प्रसारित करण्यात आल्या आहेत. कृषी अभियांत्रिकी शाखेतर्फे ५३ शेती अवजारे शेतकऱ्यांसाठी विकसित करण्यात आली आहेत. यात प्रामुख्याने भुईमृग काढणी यंत्र, सौर वाळणी यंत्र, पेरेणी यंत्र, काडीकरण गोळा करणं यंत्र, लिंबुवर्गीकरण यंत्र, सोलार फवारणी यंत्र, बीबीएफ यंत्र आदींचा समावेश होतो. कृषि खर्चिक तंत्रज्ञान देण्यासाठी विद्यापीठ प्रयत्नशील आहे. मराठवाडा विभागातील खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन, तुम, मूग, खर्बूज ज्वार, मका ही मुख्य पिके घेतली जातात तर रब्बी हंगामात रब्बीस ज्वार, गहु, हरभरा, करडई, सुर्यकुल ही पिके घेतली जातात. विद्यापीठ विकसित वाणास व बियाणास शेतकऱ्यांमध्ये मोठी विश्वासहता असून शेतकरी बांधवांची बियाणास असलेली मागणी पाहता, येणाऱ्या काळात सार्वजनिक - खासगी तत्वाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त दर्जदार बीजोत्पादन करिता विद्यापीठाचा भर राहणार आहे. गेल्या वर्षी विद्यापीठांतर्गत असलेली साधारणतः दोन हजार एकर पडित जमीन लागवडीसाठी आणून पैदासकार बियाणे उत्पादन वाढीचे प्रयत्न सुरू आहेत, यावर्षी अधिक दोन हजार एकर पडित जमीन बीजोत्पादनाखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.

मराठवाड्यातील मुख्य खरीप हंगामातील सोयाबीन पिकात विद्यापीठ विकसित अनेक वाण शेतकऱ्यांमध्ये प्रचलित असून यात प्रामुख्याने एमएयुएस-७१ या वाणाचा उल्लेख करावा लागेल, सध्या विद्यापीठ विकसित एमएयुएस-६११ हा अधिक उत्पादन देणारा सोयाबीन वाण शेतकरी बांधवांच्या पसंतीस उतरला असून शेतीत यांत्रिकीकरण मोठ्या प्रमाणे होत असून यांत्रिकीकरणास अनुकूल म्हणजेच यंत्राद्वारे काढणीस उपयुक्त सोयाबीनचे एमएयुएस-६१२ हे वाण निमित्तक लोकप्रिय आहे. कपाशीत अमेरिकन संकरित वाण एनएचएच-४४ म्हणजेच नांदेड-४४ या वाणाने तब्बल दोन शतके शेतकऱ्यांच्या हृदयावर राज्य केले, महाबीज सोबत विद्यापीठाने सामंजस्य करार करून हा वाण जनुकयुग्मिष्टा परावर्तित (बीटी वाणात) करण्यात येत शेतकरी बांधवांना उपलब्ध झाला आहे. तसेच विद्यापीठ विकसित कापाशीचे एनएचएच-२५० व एनएचएच-७४५ हे दोन वाण बीटी-२ मध्ये परावर्तित करण्याकरिता महाबीज सोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. विद्यापीठाने कापाशीत अनेक देशी व अमेरिकन वाण विकसित केले आहेत.

सन २०२३ मध्ये विद्यापीठांतर्गत असलेल्या नांदेड येथील कापूस संशोधन केंद्राद्वारे निर्मित एनएच १९०१ बीटी (एनएच १९०१), एनएच १९०२ (एनएच १९०२) बीटी व एनएच १९०४ (एनएच १९०४) बीटी ही तीन अमेरिकन सरळ वाणात बीटीचा अंतर्भाव करण्यात आला असून यामुळे शेतकरी बांधवांचा बियाणांवर होणारा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. हे वाण कोरडवाहू लागवडीमध्ये उत्पादनात सातत्य देणारे वाण आहेत. महाराष्ट्राबाहेरीही गुजरात व मध्यप्रदेश या राज्यात या वाणाची लागवडीकरिता मान्यता दिली आहे, सध्या वाण बीटी मध्ये परावर्तित करणारे परभणी कृषि विद्यापीठ राज्यातील पहिले कृषि विद्यापीठ ठरले आहे, ही विद्यापीठाकरिता अभिमानाची बाब आहे.

कडधान्य पीकात तुर हे मुख्य पिक असून विद्यापीठाने अनेक वाण विकसित केले आहेत. यातील बीएसएमआर-७३६ व बीडीएन-७११ या वाणाची महाराष्ट्रातच नव्हे तर इतर राज्यात लागवड केली जात आहे, ही विद्यापीठाची संशोधनातील मोठी उपलब्धी आहे. तुरीचा बीएसएमआर-७३६ हा वाणाच्या दाण्याचा रंग लाल असून मर व वंध्यत्व रोगास प्रतिकारक असून सोयाबीन व उडीद अंतर पीकास योग्य आहे. बीडीएन-७११ हा वाण कमी कालावधीस तयार होणारा असल्यामुळे कोरडवाहू शेतीत उपयुक्त आहे. मराठवाड्यातील तुर पिकाखालील अर्धे अधिक क्षेत्रावर बीडीएन-७११ या वाणाची लागवड केली जाते, ही विद्यापीठाकरिता अभिमानाची बाब आहे. बीडीएन-२०१३-४९ (गोदावरी) हा वाण

प्रथिनांचे जास्त प्रमाण असणारा, १६०-१६५ दिवस कालावधीत तयार होणारा हेक्टरी १९-२३ किंटल उत्पादन क्षमता असणारा, या वाणाची उत्तम प्रतीची दाळ शिजविण्याची गुणवत्ता आहे, हा वाण संकरित पाणी असल्यास चांगले उत्पादन देतो.

रबी हंगामातील ज्वारी हे मराठवाड्यात मुख्य पीक असून विद्यापीठ विकसित परभणी मोती, परभणी ज्योती, परभणी सुपर मोती हे विद्यार्थित वाण अन्त्यावधीत शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय झाले आहेत, या वाणाचे दाणे मोठ्यापणे चमकदार असून भाकरीची प्रत उत्तम आहे. खरीपासाठी विद्यापीठ विकसित ज्वारीचा पीव्ही के-८०१ (परभणी श्वेता) हा वाण पावसात सापडल्यास इतर वाणांच्या तुलनेने दाणे कमी काळे पडतात, याचा कडबा चवदार, पीठिक व पचण्यास सुलभ आहे. परभणी शक्ती हा देशातील ज्वारीचा पहिला जैवसंपृद्ध वाण हैद्राबाद येथील आंतरराष्ट्रीय संस्था इन्स्टीट्यूट ऑफ अग्रिकल्चरल रिसर्च अला असून यात लोह व जस्त यांचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे मानवातील कुपोषणावर मात करणे शक्य होऊ शकेल. बाजरी पिकाचा अधिकतम लोह व जस्त असणारे जैवसंपृद्ध वाण एचबी १२०० व एचबी १२६९ या वाण विकसित केले असून २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्ये वर्ष म्हणून साजरे करण्यात आले, या निमित्त विद्यापीठाच्या वतीने विविध माध्यमातून भरड धान्याबाबत जनजागृती करण्यात आली.

आज देश मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल आयात करित असून करडई लागवडीखालील क्षेत्र वाढीस मोठा वाव आहे. करडई पीकातील विद्यापीठ विकसित पीबीएनएस-१२ (परभणी मुक्ता) हा वाण कोरडवाहू व बागायतीस योग्य असून मावा कीडीस कमी बळी पडते व २९ टक्के तेलाचे प्रमाण आहे तसेच पीबीएनएस-४० हा बीन काटेरी वाणाच्या पाकळ्या गोळा करण्यास सुलभ आहे. करडईतील या वाणास महाराष्ट्रातच नव्हे तर इतर राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठी मागणी आहे. पीबीएनएस-८६ (पुर्णा) हा वाण जिरायती क्षेत्रात हेक्टरी १० ते १२ किंटल तर बागायती क्षेत्रात २० ते २२ किंटल उत्पादन क्षमता असून तेलाचे प्रमाण ३० टक्के आहे. नुकताच प्रसारित झालेला पीबीएनएस १५४ (परभणी सुवर्णा) वाण कोरडवाहू आणि बागायती लागवडीसाठी उपयुक्त असून यात तेलाचे प्रमाण अधिक (३०.९० टक्के) व २९ टक्के तेलाचे प्रमाण ३४-३५ टक्के आहे तर याची उत्पादन क्षमता कोरडवाहू मध्ये हेक्टरी १८-२० किंटल तर बागायती मध्ये २१-२३ किंटल आहे.

जवस हे पिक मराठवाड्यात पर्यायी पिक म्हणून लागवड करता येऊ शकते, या पिकाचा विद्यापीठ विकसित एलएसएल-९३ (लातुर-९३) हा केवळ ९० दिवस कालवधीत तयार होणारा अधिक उत्पादन देणारा वाण कोरडवाहू लागवडीस शिफारस करण्यात आली आहे. हरभरात घाटेअडीस कमी बळी पडणारा आकाश (बीडीएनजी-७९५) असो की, मका शक्ती (पीएमएच-१९) व बाजरीत गोसावी रोगास प्रतिबंधक एबीपीसी-४-३ हे वाण विद्यापीठाची ओळख आहे. भाजीपाला पिकात अधिक उत्पादन देणारी परभणी क्रांती भेंडीने राज्याच्या किंबहुना देशाच्याही सीमा ओलंडच्या असून मिरचीचे परभणी मिरची हा वाण मराठवाडा विभागामध्ये खरीप हंगामासाठी उपयुक्त ठरला आहे. फळपीकात लिंबुमधील झुपायुक्त येणारे प्रमालिनी व विक्रम वाण शेतकऱ्यात लोकप्रिय ठरले असून गोंडिचक म्हणून अजिंठा हे वाण प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करण्यासाठी उपयुक्त आहे. विद्यापीठाने सितफळदात धारू-६ व काठदात एलरो हे वाण विकसित केले आहेत. विद्यापीठ विकसित विविध पीकांचे सरळ वाणाचे बियाणे शेतकरी स्वतःचे बियाणे स्वतः तयार करून पुनर्वापर करू शकतात. विद्यापीठ विकसित ६८ वाणाची नोंदणी राष्ट्रीय पीक वाण संरक्षण प्राधिकरणाकडे केलेली आहे. पशुविज्ञान शाखेत गायीची संकरित जात होलंदेश विकसित केली आहे.

संशोधनाच्या आधारे विकसित करण्यात आलेली कृषी औजारे व यंत्राचा विचार करता, विद्यापीठ विकसित पाच फणी रंद सरी वरंबा (बीबीएफ) बी खत पेरेणीसह फवारणी व रासणी यंत्राचा उल्लेख करावा लागेल. हवामान बदलामुळे पावसाचे आगमन, वितरण तसेच निर्गमन यामध्ये बराचसा बदल आढळून येत असून याचा परिणाम सोयाबीन उत्पादनावर दिवसून येत आहे. पडणाऱ्या पावसाचे जास्तीत जास्त मुलस्थानी जलसंधारण करून त्याचा पावसाच्या खंड काळात उपयोग करणे जसे आवश्यक आहे तसेच अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करण्यासाठी उपाययोजना करणेही आवश्यक आहे. याकरिता परभणी कृषी विद्यापीठ विकसित पाच फणी रंद सरी वरंबा (बीबीएफ) बी खत पेरेणीसह फवारणी व रासणी यंत्र सोयाबीन उत्पादनांना निश्चितच वकान ठरणार आहे.

अल्पभुधारकांसाठी एकात्मिक शेती पध्दतीचे मॉडेल विकसित करणे, जलसंधारण व संरक्षित ओलीतासाठी वापर, हवामान बदलाच्या पाक्षीभुमीवर पीकांची उत्पादन स्थिरता राखण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे, भरड धान्य आधारीत पीक पध्दतीत एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, शेतीतील यांत्रिकीकरणाच्या दृष्टीने विविध पीक लागवडपासून ते काढणी पर्यंत यांत्रिकीकरण व काढणी पध्दत तंत्रज्ञानाचा व अवजारांचा विकास करणे, मुल्यवर्धीत प्रक्रिया उद्योगांचा विकास करणे, कमी किंमतीत कृषी अवजारे उत्पादीत करणे आदी क्षेत्रात संशोधनास विद्यापीठाचे प्राधान्य राहणार आहे.

डिजिटल शेती संशोधनास प्रोत्साहनाकरिता विद्यापीठात जागतिक बँक व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली पुरस्कृत राष्ट्रीय उच्च शिक्षण प्रकल्पाच्या माध्यमातून जगातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांशी माहितीची देवाण घेवाण होत आहे, यामुळे डिजिटल शेतीचे वारे मराठवाड्यात वाहू लागतील असा विश्वास आहे. येणाऱ्या काळात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा शेतीत फवारणी करिता आणि किड व रोगांचे निरीक्षण आदी कार्यात वापर वाढणार असून याकरिता विद्यापीठ प्रयत्नशील आहे. मराठवाड्यात कृषि यांत्रिकीकरण वाढीकरिता संशोधन व कौशल्य विकास हे उद्दीष्ट ठेवून देशातील नामांकित विविध कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. कृषि यांत्रिकीकरणातील न्यु हॉलंड व टाफे या जगातील अग्रगण्य कंपनीशी करार करण्यात आला असून या माध्यमातून शेतकरी बांधवांना अद्यावत कृषि यंत्र व औजारे याबाबत प्रशिक्षित करण्यात येत आहे. संशोधनाच्या आधारे कृषि तंत्रज्ञानाच्या विकास आणि प्रसाराकरिता सहकार्य, नवअन्वेषण आणि व्यापारिकरण (Collaboration, Innovation Commercialization) याबाबींवर भर द्यावा लागेल.

हवामानातील बदल, नैसर्गिक साधनसामुग्रीचा होणारा ऱ्हास, अपेक्षित सुरक्षित अन्न उत्पादन, नवनवीन किडी-रोगांचा उपद्रव, शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती यांचा विचार करून लघु व दीर्घ कालावधीच्या संशोधन कार्याची आखणी करण्यात आली आहे. गेली पाच दशके वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाने भरीव असे योगदान दिले असून शाश्वत कृषि विकास साधणे हे उद्दीष्ट डोळ्यासमोर येणाऱ्या आव्हानास सामोरे जाण्यासाठी विद्यापीठ करिबध आहे.

शेतकरी हा एक मोठा कृषि संशोधक आहे, कृषि विद्यापीठाच्या संशोधनात प्रयोगशील, अनुभवी आणि अभ्यासु शेतकरी बांधवांचा सहभाग घेण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी कमी पर्जन्यमान, पावसातील खंड काळात विद्यापीठाने वेळोवेळी राज्यातील कृषि विस्तारक, कृषि संशोधक, आणि प्रगतशील शेतकरी यांच्या करिता कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या, या कार्यशाळांत एक हंगामातील समस्यावरील उपायांची चर्चा करून सदर शिफारसी शेतकरी बांधवांपर्यंत त्वरित पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पिक उत्पादनातील बियाणे हे एक अत्यंत महत्वाची मुख्यत्त्व निवडिका असून डिसेंबर २०२३ मध्ये विद्यापीठाच्या वतीने बारावी राष्ट्रीय बियाणे परिषदेचे राज्यस्तरीय आयोजन करण्यात आले, यानिमित्त आयोजित चर्चासत्रात देशातील बीजोत्पादन क्षेत्रातील नामांकित तज्ञ, संशोधक, धोरण कर्ते, कृषि मंत्रालयातील अधिकारी, शेतकरी उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी, प्रगतशील शेतकरी यांनी सक्रीय सहभाग नोंदविला. या चर्चासत्रातून दर्जदार बीजोत्पादनाकरिता पुढे आलेल्या शिफारशांची अंमलबजावणी करिता केंद्र शासन, राज्य शासन, कृषि विद्यापीठे आणि शेतकरी बांधव यांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.

सन २०२२ मध्ये सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२३ दरम्यान 'माझा एक दिवस माझ्या बळिराजासाठी', उपक्रमांतर्गत मराठवाड्यातील ३५० पेक्षा जास्त गावात विद्यापीठ शाखांन्त्या पथकांनी भेटी देऊन त्या त्या भागातील शेतकरी बांधवांच्या शेती विषयक समस्या समजून घेतल्या व त्यांना मार्गदर्शन केले. हा उपक्रम भविष्यातही राबविण्यात येऊन प्रत्येक महिन्यात एक दिवस विद्यापीठातील संपूर्ण शाखांन् व प्राध्यापक सहभागी होणार आहेत, यामुळे शेतकरी बांधवांची विद्यापीठाची नाळ अधिक मजबुत होईल. देशाची सुरक्षा ही अन्न सुरक्षेवर अवलंबून आहे. येणाऱ्या काळात शेतकरी आणि कृषि विद्यापीठ यांच्यातील नाते अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शेती आणि शेतकरी विकासाकरिता शेतकरी-शासन-कृषि विद्यापीठ-कृषि निगमदी विविध कंपन्या, कृषि संस्था या सर्वांनी एकत्रित कार्य करण्याची गरज आहे.

पुनश्चत - 'शेतकरी देवो भवः'

डॉ.इन्द्र मणि

कुलगुरु, वनामकृषि, परभणी




मार्गशीर्ष/पौष शके १९४५

र रविवार		मार्गशीर्ष कृ ११ सफला एकादशी	शुभ दिवस पौष शु. ३/४ विनायक चतुर्थी		पौष शु. ११ पुनवा एकादशी	शुभ दिवस (स.७.२३ प.)	शुभ दिवस लाला लजपतराय जयंती (सायं. ४.५१ प.)
सो सोमवार	मार्गशीर्ष कृ ५ ख्रिस्ताब्द २०२४ प्रारंभ	मार्गशीर्ष कृ १२	शुभ दिवस पौष शु. ५ मकरसंक्रांती		पौष शु. १२	शुभ दिवस	पौष कृ. ४ संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय ०९.१४
मं मंगलवार	मार्गशीर्ष कृ ६	शुभ दिवस (सायं. ५.१० प.)	मार्गशीर्ष कृ १३ भीमप्रदोष शिवरात्री	पौष शु. ६ संक्रांत करिदिन धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज राज्याभिषेक दिन	पौष शु. १३ नेताजी सुभाष जयंती हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे जयंती	शुभ दिवस पौष कृ. ४ महात्मा गांधी पुण्यतिथी हुतात्मा दिन	
बु बुधवार	मार्गशीर्ष कृ ७ सावित्रीबाई फुले जयंती महिला मुक्तिदिन	शुभ दिवस	मार्गशीर्ष कृ १४	पौष शु. ७ गुरू गोविंदसिंह जयंती	शुभ दिवस पौष शु. १४	शुभ दिवस (स.७.३८ ते रात्री९.४९)	पौष कृ. ५ शुभ दिवस
गु गुरुवार	मार्गशीर्ष कृ ८ कालाष्टमी	शुभ दिवस	मार्गशीर्ष अमावास्या दर्शवेळा अमावास्या	पौष शु. ८ दुर्गाष्टमी	शुभ दिवस (स.९.२२ नं.)	शुभ दिवस (स.१०.३३ नं.)	
शु शुक्रवार	मार्गशीर्ष कृ ९	शुभ दिवस	मार्गशीर्ष अमावास्या समाप्ती सायं. ०५.२७	पौष शु. ९	पौष शु. १५ पौर्णिमा	पौष कृ. १ गणराज्य दिन	
श शनिवार	मार्गशीर्ष कृ १० पार्श्वनाथ जयंती (जैन) श्री गोंदवलेकर महाराज पुण्यतिथी	शुभ दिवस (दु.१२.१९ प.)	पौष शु. १ राष्ट्रीय युवा दिन स्वामी विवेकानंद जयंती राजमाता जिजाऊसाहेब भोसले जयंती (तारखेप्रमाणे)	पौष शु. १०	पौष कृ. २	शुभ दिवस (दु.१.०० नं.)	

या महिन्यातील करावयाची कामे


- बागायती ज्वारी, करडई, हरभरा, सुर्यकुल या पिकांना फुलोरा व दाणे भरतेवळी पाणी द्यावे
- गहु पिकास शिफारशीनुसार खते देऊन पाणी द्यावे. तांबेरा रोगाचा आणि उंदराचा बंदोबस्त करावा.
- करडईवरील मावा व हरभऱ्यावरील घाटे अळीचे वेळीच नियंत्रण करावे.
- सूरू ऊस लागवडीसाठी रोगमुक्त बेण्याची निवड करावी व भुईमूग, गवार, कांदा ही आंतरपिके घ्यावीत.
- सु रू ऊ स लागवडीचे वेळी शिफारशीनुसार खताच्या मात्रा द्याव्यात. (२५० : ११५ : ११५) नत्र, स्फुरद, पालाश किलो प्रति हेक्टरी.
- उन्हाळी भुईमूगाची पेरणी करावी, शिफारशीनुसार जिवाणू व रासायनिक खते द्यावीत.
- उन्हाळी भाजीपाला पिकाची लागवड करावी.
- टरबुजाच्या पिकास लागवडीनंतरच्या खताचा हप्ता शिफारशीनुसार द्यावा व लाल भुंया पासून पिकाचे संरक्षण करावे.
- आंबा मोहोराचे तुडतुडे, भुरी या किडी व रोगापासून संरक्षण करावे.
- उन्हाळ्यात जनावरांना हिरव्या चान्यासाठी निळवा, मका, ज्वारीचे सुधारित वाणाची निवड करून दुसऱ्या पंथरवाड्यात पेरणी करावी.
- द्राक्ष पिकावर येणारी किडी व रोगाचे शिफारशीनुसार रोग प्रतिबंध औषधाचा वापर करून नियंत्रण करावे.
- खोडवा उसातील पाघट जाळू नये. कुट्टी करून सरीमध्ये व्यवस्थित लावावी.
- कापूस फरदड घेऊ नये. पन्हाटी काढून खोल नांगरट करावी.



ज्वारी : परभणी शक्ती



ज्वारी : परभणी ज्योती



ज्वारी : परभणी मोती



कृषि महाविद्यालय, परभणी

* स्थापना : सन १९५६ * दूरध्वनी : (०२४५२) २३३००७

महत्वाच्या नोंदी

उन्हाळी भुईमूग लागवड तंत्रज्ञान

खाद्यतेल मानवी आहारातील अविभाज्य घटक आहे. मानवी संस्कृतीच्या विकासाबरोबरच मनुष्य आपली गरज सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल, करंडई, जवस, तीळ ई. पासून मिळणाऱ्या तेलापासून पूर्ण करीत आहे. शास्त्रज्ञ व शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नातून यशस्वी झालेल्या हरितक्रांतीमुळे आपण अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो असलो तरी वाढत्या लोकसंख्येची गरज लक्षात घेता खाद्यतेलाबाबतीत आजही आपण स्वालंबी नाहीत हि खेदाची बाब आहे.

भुईमुगाच्या दाण्यामध्ये ५०% तेल, २५% प्रथिने, १८% कर्बोदके, ५% पाणी व अल्प प्रमाणत जीवनसत्त्वे आहेत. सतत १० तास उकळलेल्या तेलाच्या गुणधर्मात बदल होत नाही. शेंगदाणे खाण्यास रुचकर व पचण्यास सुलभ असतात. शेंगदाणे खाल्ल्यास शारीरिक पेशी देखील सुदृढ होतात, म्हणूनच त्याला 'गरिबांचे काजू' देखील म्हणतात.

१) भुईमुग पिकांच्या व्यवस्थापनामध्ये कोणत्या बाबी महत्वाच्या आहेत ?

दिवसेंदिवस वातावरणात बदल होत आहे, जमिनीच्या अन्नद्रव्य पुर्वठा करण्याच्या क्षमतेत देखील बदल होत आहे, यासाठी लागवडीच्या तांत्रिक बाबी मध्ये बदल करणे गरजेचे झाले आहे. या दृष्टीकोनातून भुईमूग पिकाचे सुधारित तंत्रज्ञान जाणून घेणे आवश्यक आहे.

उत्पादकता कमी असण्याची कारणे:

१. जुन्या व कमी उत्पादनक्षम वाणांचा वापर.
२. हेक्टरी कमी बियाणे वापरणे.
३. कमी उत्पादनक्षम जमिनीत लागवड.
४. योग्य नियोजनाचा अभाव.
५. कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव.

२) भुईमुग पिकासाठी जमीन कशी निवडावी व पूर्वमशागत कताना काय काळजी घ्यावी ?

जमीन: भुईमूग हे पिक मध्यम, चांगला निचरा असलेल्या, मऊ, भुसभुशीत व सेंद्रिय पदार्थ असलेल्या जमिनीत चांगले येते. खूप भारी, चिकट व कडक होणाऱ्या जमिनीत शेंगाची वाढ चांगली होत नाही. तसेच शेंगा खुडण्याचे प्रमाण वाढते. रबी व उन्हाळ्यात पाणी द्यावे लागत असल्याने जमीन समपातळीत असणे आवश्यक आहे.

पूर्वमशागत : जमिनीचा कमीत कमी २० से.मी. थर भुसभुशीत करणे आवश्यक आहे. यासाठी ६-१२ इंच खोल नांगरी नंतर उभी आडवी वखरणी करावी. शेवटच्या वखराच्या पाळी पूर्वी हेक्टरी ७.५ टन चांगले कुजलेले शेणखत जमिनीत मिसळावे. सरी वरंबा पद्धतीने लागवड करावयाची असल्यास वरंबा चार ओळीचा असावा. फवारा पद्धतीने पाणी देण्याची सोय नसल्यास सरी वरंबा दोन ओळीचा असावा.

३) भुईमुग पिकासाठी हवामान कसे असावे ?

हवामान: तापमान व भुईमूग वाढीचा घनिष्ट संबंध आहे. तापमान २०-३० अंश से. असल्यास भुईमुगाच्या झाडाची वाढ चांगली होते. झाडाच्या कायीक वाढीसाठी २७-३० अंश से. तापमान योग्य असते. उन्हाळी हंगामात तापमान १९ अंश से.पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे, अन्यथा उगवण क्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो. तापमान सतत ३३ अंश से. पेक्षा जास्त असल्यास परागकणांच्या जीवनक्षमतेवर परिणाम होतो म्हणून परेणीची वेळ अतिशय महत्वाची आहे.

४) भुईमुग परेणीची योग्य वेळ कोणती ?

परेणीचे हंगाम : खरीप: १५ जून ते ७ जुल , रबी - १५ - ३० सप्टेंबर, उन्हाळी - १५ जानेवारी ते ८ फेब्रुवारी

उन्हाळी लागवडीचे महत्व : उन्हाळी हंगामात दिवसा १० ते १२ तास भरपूर आणि स्वच्छ सूर्यप्रकाश मिळतो. पाण्याची मुबलक उपलब्धता, किडी-रोगांचा कमी प्रादुर्भाव व स्वच्छ सूर्यप्रकाश इ. मुळे खरीपापेक्षा उन्हाळी भुईमुगाचे जास्त उत्पादन मिळते. शिवाय उन्हाळ्यात भुईमुगाच्या पाण्याचा जनावरांना पौष्टिक व पुरवणीचा चारा म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापर होतो तसेच पिकांची फेरपालट साध्य करता येते. तसेच उन्हाळी भुईमुगात तेलाचे प्रमाण खरीपापेक्षा जास्त असल्यामुळे अधिक तेलासाठी उन्हाळी पीक फायद्याचे ठरते.

५) अधिक उत्पादनासाठी भुईमुग पिकाचे कोणते वाण लागवडीसाठी निवडावेत ?

वाण	पक्तेचा कालावधी (दिवस)	प्रकार	हंगाम	सरासरी उत्पादन (क्वी./हे.)
एस.बी. ११	११०-११५	उपट्या	खरीप/उन्हाळी	१२-१४
टीएजी २४	१००-१०५	उपट्या	खरीप/उन्हाळी	१४-१६
एलजीएन-१	१०५-११०	उपट्या	खरीप/उन्हाळी	१४-१६
टीएलजी-४५	११५-१२०	उपट्या	खरीप/उन्हाळी	१५-१८
टीजी २६	९५-१००	उपट्या	खरीप/उन्हाळी	१४-१६
जेएल २४	९०-११०	उपट्या	खरीप	१८-२०
जेएल २२०	९०-९५	उपट्या	खरीप	२०-२४

६) परेणीसाठी बियाण्याचे प्रमाण किती वापरावे ?

बियाण्याचे प्रमाण : परेणीसाठी सर्वसाधारणपणे १०० ते १२५ कि./हे. बियाणे लागते. परंतु बियाण्याचे प्रमाण ठरविताना निवडलेले वाण ,हेक्टरी

रोपांची संख्या, १०० दाण्याचे वजन, उगवणक्षमता व परेणीचे अंतर ई. चा विचार करावा. एस.बी. ११, टीएजी २४ या उपट्या वाणांसाठी हेक्टरी १०० कि. बियाणे वापरावे, तर जेएल २४ साठी हेक्टरी १२५ कि. बियाणे वापरावे. निमपसाच्या व पसाच्या वाणांसाठी ८०-८५ कि./हे. बियाणे वापरावे.

७) भुईमुग पिकांसाठी परेणीपूर्वी बीज प्रक्रिया करावी लागते का ?

बीज प्रक्रिया :

१. ३ ग्रॅम थायरम किंवा २ ग्रॅम बाविस्टीन किंवा ट्रायकोडॅमा ५ ग्रॅम प्रती किलो बियाणे.
२. प्रती १० किलो बियाण्यास रायझोबीएम व पी.एस.बी. प्रत्येकी २५० ग्रॅम किंवा द्रव स्वरूपात असेल तर प्रत्येकी ६० मिली.

८) परेणीचे अंतर किती असावे व परेणीच्या कोणत्या पद्धती आहेत ?

परेणीचे अंतर : परेणी ३० x १० से.मी. अंतरावर करावी जेणे करून हेक्टरी ३.३३ लाख रोपांची संख्या राखता येईल. टोकन पद्धतीने परेणी केल्यास २५ टक्के बियाण्यांची बचत होते.

परेणीची पद्धत :

१. सपाट वाफा पद्धत : परेणी यंत्राच्या सहाय्याने वापरशवार ३० x १० से.मी. अंतरावर परेणी करावी व लगेच पाणी द्यावे. ७-८ दिवसांनी नांग्या भरून घ्याव्यात.
२. रुंद वाफा पद्धत अतिशय फायदेशीर आहे. तीन किंवा चार ओळीचे रुंद वाफा करून परेणी करावी. तुषार सिंचनाचा वापर करावा.तुषार सिंचनापेक्षा पाणी देण्याची सोय नसल्यास वाफा दोन ओळीचा करावा.

९) भुईमुग पिकासाठी खत व्यवस्थापन कसे करावे ?

अन्नद्रव्य व्यवस्थापन :

१. सेंद्रिय खते: ७.५ टन /हे. शेणखत किंवा कंपोस्ट.
२. जैविक खते : प्रती १० किलो बियाण्यास रायझोबीएम व पी.एस.बी. प्रत्येकी २५० ग्रॅम किंवा द्रव स्वरूपात असेल तर प्रत्येकी ६० मिली.
३. मुख्य रासायनिक खते : २५:५०:०० कि. नत्र, स्फुरद व पालाश प्रती हेक्टर द्यावे.
४. दुय्यम रासायनिक खते : सल्फर व कॅल्शियम हि दुय्यम अन्नद्रव्य महत्वाची आहेत यासाठी २०० कि. जिप्सम/हे. परेताना जमिनीतून द्यावे तर २०० कि. जिप्सम /हे. आर्या सुटताना द्यावे.
५. सूक्ष्म अन्नद्रव्ये: सूक्ष्म अन्नद्रव्ये जसे लोह, जस्त व बोरॉन ची कमतरता असल्यास परेताना हेक्टरी २० कि. फेरस सल्फेट, २० कि. झिंक सल्फेट व ५ किलो बोरॉन परेताना द्यावे. मल्टी मायक्रोन्यूट्रीएंट ग्रेड दोन ची ०.५ % फवारणी करावी.

१०) भुईमुग पिकात आंतरमशागत करावी लागते का ?

आंतरमशागत : तणे प्रामुख्याने पाणी, अन्नघटक, सूर्यप्रकाश व हवा यासाठी मुख्य पिकाशी स्पर्धा करतात. किडी व रोगांना आश्रय देतात यामुळे उत्पन्नत २५-५० टक्के घट येवू शकते. तणांचे नियंत्रण न केल्यास तणे हेक्टरी ३८-५८ कि.नत्र, ६-९ कि.स्फुरद आणि २३-४५ कि.पालाश इ. अन्नघटकांचे शोषण करतात. तणाचा वेळीच बंदोबस्त न केल्यास पीक काढणीस अडथळा निर्माण होऊन शेंगाच्या दाण्याची प्रत खालावते.

१. भुईमुगात सर्व प्रकारच्या आंतरमशागतीची कामे आऱ्या सुटण्याच्या आत परेणीनंतर ४५ दिवसापर्यंत करावीत.
२. पहिल्या दीड महिन्यात दोन खुरपण्या आणि दोन कोळपण्या करून पीक तणविरहीत ठेवावे.
३. शेवटची कोळपणी खोल आणि फासेला दोरी बांधून करावी व यासोबत जिप्सम खत २०० कि./हेक्टर याप्रमाणे पेटावे.
४. तसेच ४० दिवसांनी आणि ५० दिवसांनी २०० लिटर पाण्याचा पन्थाचा रिकामा ड्रम दोनदा फिरवावा म्हणजे पावळ्या आऱ्या जमिनीत घुसण्यास मदत होते आणि त्यांना शेंगा लागतात.
५. बरेच शेतकरी भुईमुग पिकाच्या फांद्यावरील सर्व आऱ्या जमिनीत जाण्यासाठी झाडांना अधिक मातीची भर लावतात. परंतु यामुळे फांद्यास रोगप्रसूत बुशरीची लागण होते व सुरुवातीस तयार झालेल्या शेंगा खराब होण्याची शक्यता असते यास्तव मातीची भर फांद्यास अपायकारक होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
६. तणनाशकाचा वापर : पेंडीमिथालीन ३० ई.सॉ. - १ कि. क्रियाशील घटक/हे. उगवणीपूर्वी. इमाझीथापर १० % एस एल - ७५ मी.ली. क्रियाशील घटक/हे. उगवणीनंतर २० दिवसांनी

११) भुईमुग पिकात पाणी व्यवस्थापन कसे करावे ?

पाणी व्यवस्थापन :

१. भुईमुगास लागलेल्या एकूण फुलांपैकी फक्त ५-२० टक्के फुलांचे रुपांतर शेंगामध्ये होते.
२. एकूण लागलेल्या शेंगांपैकी ६६ टक्के शेंगा परिपक्व होतात उर्वरित ३३ टक्के शेंगा अपरिपक्व अवस्थेत असतात.
३. जास्तीत जास्त परिपक्व शेंगा एकदाच मिळविण्यासाठी झाडास लागणारे पहिले फुल व शेवटचे फुल हा कालावधी कमी असणे गरजेचे असून त्यासाठी पाणी व्यवस्थापनास अनन्य साधारण महत्त्व आहे.
४. झाडास पहिले फुल दिसताच (परेणीनंतर ३० ते ३५ दिवसांनी) पिकास पाण्याचा हलका तणा द्यावा. (५-६ दिवस पिकास पाणी देवू नये) या पाण्याच्या तणामुळे पिकाची अवास्तव वाढ रोखली जाते, रोगाचा प्रसार कमी होण्यास मदत होते व तणाच्या कालावधीत वनस्पतीत साठलेल्या अन्नचा वापर फुले निर्मितीसाठी होत असल्यामुळे जास्तीत जास्त फुले एकाच वेळी निर्माण होतात. पर्यायाने एकाच वेळी आलेल्या फुलांच्या आऱ्या एकाच वेळी जमिनीत शिरतात व त्यापासून निर्माण झालेल्या शेंगा एकाच कालावधीत परिपक्व होतात व सारख्याच

५. पिकास आऱ्या सुटण्याच्या वेळेस (परेणी नंतर ४०-४५ दिवसांनी) जमिनीत मुबलक ओलावा असणे आवश्यक आहे. या ओलाव्यामुळे आऱ्या जमिनीतील कॅल्शियम या अन्नघटकाचे शोषण करतात यामुळे शेंगांची वाढ चांगली होते. या काळात पाण्याची कमतरता झाल्यास शेंगामधील बियाण्याची वाढ अपुरी होते व पर्यायाने एका दाण्याच्या शेंगाचे व अपरिपक्व शेंगाचे प्रमाण वाढते. अशा शेंगांची उगवण शक्ती कमी असते व बियाण्याची गुणवत्ता कमी होते. याउलट पिकास पाण्याचा वापर अति झाल्यास वनस्पतीची शाकीय वाढ जास्त होते, शाकीय वाढ जास्त झाल्यास रोगाचा प्रादुर्भाव बळावतो, नवीन आऱ्या कुजण्याची भीती असते व पिकाच्या असंतुलित वाढीमुळे पिकावर फुले, आऱ्या, कच्चा शेंगा व परिपक्व शेंगा अशा सर्व अवस्था दिसून येतात म्हणून पिकात पावसाचे किंवा सिंचनाचे पाणी साचणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. शक्यतो पिकास पाणी तुषार सिंचन पद्धतीने देणे हिताचे आहे. यासर्व बाबींचा विचार करता भुईमूग पिकास खालील प्रमाणे पाणी देण्याची व्यवस्था करावी.

अ.क.	पिकाची अवस्था	परेणीनंतर पाण्याच्या पाळ्या
१	उगवणीच्या वेळी	परेणी नंतर लगेचच.
२	फुलारा येणे	३० ते ४० दिवस.
३	आऱ्या सोडण्याची अवस्था	४० ते ४५ दिवस.
४	शेंगा धरणे व दाणे भरणे	६५ ते ७० दिवस.

तसेच मार्चमध्ये १०-१२, एप्रिलमध्ये ८ ते १० व मे मध्ये ६ ते ८ दिवसाच्या अंतराने पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात.

मोकाट सिंचन : मध्यम प्रकारच्या जमिनीस ९-१० दिवसांनी, हलक्या जमिनीस ७-८ दिवसांनी

तुषार सिंचन : मध्यम प्रकारच्या जमिनीस ५-६ दिवसांनी, हलक्या जमिनीस ४-५ दिवसांनी एकूण ४-५ तास सिंचन व्यवस्था करावी.

१२) भुईमुगावरील महत्वाच्या किडी कोणत्या आहेत आणि त्यांचे नियंत्रण कसे करावे ?

कीड व रोगांचे व्यवस्थापन :

भुईमुग पिकाचे एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

मशागतीय पद्धत	१. जमिनीतील किडीच्या सुप्त अवस्था व कोष नष्ट करण्यासाठी खोल नांगर करावी.
यांत्रिक पद्धत	२. भुईमुगाच्या चारही बाजूने एंरंडी व सोयाबीन सापळा पिकाची लागवड करावी.
जैविक पद्धत	१. तंबाखूवरील आळी, घाटे आळी व पाने गुंडाळणारी आळीसाठी हेक्टरी १० कामगंध सापळे लावावेत.
	२. तंबाखूवरील पाने खाणारी आळीची अंडीपुंज व प्रथम अवस्थेतील आळ्या वेचून नष्ट कराव्यात.
	३. पक्ष्यांसाठी १०-१२ पक्षी थांबे प्रती हेक्टरी लावावेत.
जैविक पद्धत	१. निंबोळी अर्काची (५%)२० व्या दिवशी फवारणी करावी.
	२. ट्रायकोग्रामा चीनोलीस या परजीवी किटकाची हेक्टरी ५०००० अंडी लावावीत.
	३. तंबाखूवरील पाने खाणारी आळीचा प्रदुर्भाव दिसताच SLNPP विषाणू २५० LE/हेक्टरी ५०० ली. पाण्यात मिसळून फवारवे.
रासायनिक पद्धत	वरील उपाय करूनही किडी आर्थिक नुकसानीची पातळी गाठल्यास रासायनिक पद्धतीचा अवलंब करावा.

१४) भुईमुग काढणी करताना व काढणी पाऱ्यात काय काळजी घ्यावी ?

पक्तेची लक्षणे:

१. शेंगाच्या टरफलाच्या आतील रेषा ठळकपणे दिसू लागतात.
२. बिजावरणाचा रंग गुलाबी किंवा तपकिरी किंवा जातीच्या वैशिष्ट्या नुसार दिसून येतो.
३. झाडावर ७५% शेंगा पूर्ण पक्व झालेल्या असाव्यात यासाठी काही झाडे उपटून निरीक्षण करावे.
४. फांदा पिळकसर होऊन पाने गळू लागले म्हणजे पिक काढणीस तयार होते.

काढणी : काढणी ही मजुराच्या सहायाने शेंगासहित वेल उपटून किंवा बेलचलीत किंवा ट्रॅक्टरचलित नांगराच्या सहायाने केली जाते. यावेळेस जमिनीत आवश्यक तो ओलावा असणे गरजेचे आहे. म्हणून पिकास काढणीपूर्वी ८-१० दिवस अगोदर हलके पाणी द्यावे.

शेंगा वाळविणे :

साठवणुकीत अनिष्ट परिणाम होवू नये म्हणून शेंगातील ओलाव्याचे प्रमाण ८ ते ९ टक्क्यांपर्यंत असावे त्यासाठी शेंगा सावलीत वाळवाव्यात.

उत्पादन:

उन्हाळी हंगामात उपट्या जाती पासून प्रती हेक्टरी २५ ते ३० क्विंटल तर निमपसा/पसऱ्या जाती पासून ३० ते ३५ क्विंटल शेंगाचे उत्पादन मिळते तर ५ ते ६ टन वाळलेल्या चाऱ्याचे उत्पादन मिळते

क्रमशः : माहे - सप्टेंबर



रेशीम किटकावर उपद्रव करणाऱ्या उडी माशी व रोगांचे व्यवस्थापन :

फेब्रुवारी २०२४

डॉ. चंद्रकांत लटपटे
प्रभारी अधिकारी
मो. : ७५८८६९२६२२

श्री धनंजय मोहोद
वारिष्ठ संशोधन सहाय्यक
मो. ९४०३३९२११९

डॉ. संजोग बोकड
कृषि सहाय्यक
मो. ९९२१७५२०००

रेशीम संशोधन योजना व.ना.म.कृ.वि, परभणी.

उडी माशी डिप्टेरा वर्गातील टॅक्निडी या फॅमीलीत मोडणारी असून निरनिराळ्या शेत पिकांच्या विविध लिपीडोप्टेरन वर्गातील किडींवर उपद्रव करणारी (हायपर पॅरासाइट) किड होय. ऊडी माशी व्यतिरिक्त रेशीम किटकांवर एअर विंग, डर्मिस्टिड बटल, प्रेझ मॅन्टीड, रिडूव्हिड बग, स्टीक बग, वास्प आणि लाल मुंग्या हे किटक उपद्रव करतात. या सर्व किटकांमध्ये उडी माशी ही रेशीम कोष पिकाचे आर्थीक नुकसान करणारी (३० टक्के पर्यंत) व अळीच्या शरीराच्या आत उपजिवीका करणारी (एन्डो लारव्हल) परोपजिवी किड होय. रेशीम किटकावर उपजिवीका करणाऱ्या उडी माशी तिन प्रकारच्या असतात. १) तुती रेशीम किटकावरील उडी माशी एक्झोस्टिटा बॉम्बिक्स २) मुगा रेशीम किटकावरील, एक्झोस्टिटा सॉरिबिलिस आणि ३) टसर रेशीम किटकावरील उडी माशी ब्लेफेरियाझेबिना या होय.

उडी माशीचा प्रादुर्भाव रेशीम किटकाच्या अळीवर झाल्यावर अळीचा किंवा कोषाचा मृत्यू निश्चित होतो. उडी माशीचा उपद्रव संपूर्ण देशात पसरला असून चारही प्रकारच्या रेशीम किटकांवर प्रादुर्भाव जाणवतो. देशाच्या पुर्वोत्तर विभागातील आसाम या राज्यात उडी माशीने हाहाकार माजवला असून या किडीचा उपद्रव झाल्यामुळे मुगा रेशीम उद्योग धोक्यात आला आहे. मुगा रेशीम कोष पिकाचे ३० टक्के पेक्षा जास्त नुकसान आसाम राज्यातील काही भागात होत आहे.

उडी माशी प्रादुर्भावाची लक्षणे व नुकसानीचा प्रकार

रेशीम किटकाच्या चौथ्या किंवा पाचव्या अवस्थेतील अळीवर



अंडी सापडतात किंवा प्रादुर्भावग्रस्त अळीच्या शरीरावर काळे ब्रण (एन्टरन्स होल) दिसते किंवा उडी माशीची अळी (ग्रब) कोषातून बाहेर पडलेले काळ्या रंगाचे छिद्र दिसतात. वाढीच्या चौथ्या अवस्थेत उडी माशीचा प्रादुर्भाव झाला तर कोष विणण्या अगोदरच रेशीम अळी मृत पावते. या उलट पाचव्या वाढीच्या अवस्थेत उशिरा उडी माशीने प्रादुर्भाव केलातर रेशीम अळी कमकुवत कोष तयार करते आणि अशा प्रकारच्या कोषातून उडी माशीच्या अळ्या (ग्रब) बाहेर पडतात. अशा प्रकारचे कोष विणण करण्यासाठी सक्षम राहत नसून धागा तुकडे तुकडे स्वरूपात मिळतो.

रेशीम किटकावर उडी माशी परोपजिवीकरण (होस्ट पॅरासाइट ईट-न्याक्शन)

उडी माशीसाठी प्रौढ रेशीम किटक (अळी) उत्तम प्रकारचे प्रथीने युक्त अन्न असल्यामुळे उडी माशीने प्रादुर्भावग्रस्त रेशीम अळी मृत पावते व कोष पिकाचे नुकसान होते. रेशीम अळीचा पूर्ण फडशा पाडल्या नंतर अळीच्या शरीरातून उडी माशीच्या अळ्या (ग्रब) बाहेर पडून जमिनीवर रेंगतात व जमिनीत कोष अवस्थेत जातात. परंतु उशिरा प्रादुर्भावग्रस्त झालेल्या रेशीम अळीतून उडी माशीच्या अळ्या बाहेर न येता काही अंशी रेशीम कोषात पण कोष अवस्थेत जातात. कोषातून बाहेर पडल्या नंतर रेशीम कोषातून बाहेर पडतात व पुन्हा अळीच्या शरीरावर बसून मादी उडी माशी पुन्हा अंडी घालते.

उडी माशीचा जिवनक्रम

प्रौढ ऊडी माशी काळ्या करड्या रंगाच्या असून पाठीवर चार लांब रेषा असतात. नर माशी आकाराने मोठी आणि मादी माशी पेक्षा लांबट असते. नर माशी ५ ते १५ दिवसतर मादी माशी २० ते २५ दिवस जगत निसर्गात फुला मधिल भाग (नेक्टर) आणि मध्खाते व उपजिवीका करते. रेशीम किटकाच्या पाचव्या व चौथ्या वाढीच्या अवस्थेतील अळीच्या शरीरावर एक किंवा दोन अंडी घालते मुगा रेशीम किटकावरील उडी माशीची अंडी देण्याची क्षमता ९० ते ९०० पर्यंत असते. ऊडी माशी रेशीम अळीच्या खंड वलयाच्या ठिकाणी अंडी घालते. पाचव्या वाढीच्या अवस्थेत उडी माशीची अळी रेशीम अळीच्या शरीरात ७ दिवस राहाते. अळी शरीराबाहेर पडल्या बरोबर २४ तासात उडी माशीचे रूपांतर कोष

अवस्थेत (प्युपा) मध्ये होते.

अंडी : उडी माशीचे अंडे मॅक्रोटायड प्रकारचे असून पांढऱ्या (क्रिमी व्हाइट) रंगाचे व एका बाजुला निमुळते गोलाकार आकाराचे असतात. तापमानाच्या बदला प्रमाणे मुगा रेशीम किटकावरील उडी माशीचे अंडी उष्ण काळ १५ दिवसांचा असून मराठवाडा विभागातील तापमानात तुती रेशीम किटकावरील उडी माशीने घातलेल्या अंड्यातून १ ते ३ दिवसात माशीची अळी अंडीतून जन्म घेवून बाहेर पडते.

उडी माशी अळी अवस्था (मॅगॉट)

अळी पाय विरहित (अॅपोडस) प्रकारची असून अळीचे शरीर १२ खंड वलयात (१ + ३ + ८) विभागलेले असते. पहिल्या अवस्थेतील अळीतून जन्मलेली अळी तोंडाच्या हुकूच्या सहाय्याने रेशीम किटकाच्या त्वचेला छिद्र पाडून शरीराच्या आत प्रवेश करतात. अळ्या पिवळसर पांढऱ्या रंगाच्या असतात. रेशीम किटकाच्या शरीराच्या आतील द्राव्यावर उपजिवीका करतात. रेशीम किटकाच्या शरीराच्या आत प्रवेश केलेले काळसर छिद्र शेपटी सारखे उघडे असते व त्यातून हवा आत आल्याने उडी माशीच्या परोपजिवी अळीला श्वसनाचा पुरवठा होतो. अळीची प्रथम अवस्था २.५ दिवसाची, दुसरी अवस्था २.५ दिवसाची असून तिसरी अवस्था मात्र रेशीम किटकाच्या शरीरातील स्निग्ध पदार्थ (फॅट बॉडीज) आणि रेशीम ग्रंथीचा (सिल्कग्लॅन्ड) ३ दिवस पडशा पाडतो.

उडी माशी कोष अवस्था (प्युपा)

उडी माशीच्या परोपजिवी अळीची रेशीम किटकाच्या अळीच्या शरीरात पूर्ण वाढ झाल्या नंतर कोष अवस्थेत जाण्याअगोदर रेशीम अळीच्या शरीराच्या बाहेर पडते व फरशिवर किंवा जमिनीवर रेंगते. दोन फरशिव्या फटित, रेशीम शेडच्या कडेला जमीनीत उडी माशी कोष अवस्थेत ९ ते १८ दिवस कालावधीकरीता जाते. नंतर कोषातून प्रौढ माशी बाहेर पडते. अशा प्रकारे २२ दिवसात जिवणक्रम पूर्ण करते.

उडी माशीचे एकाल्मीक व्यवस्थापन

- १) रेशीमकिटकाच्या वाढीच्या चौथ्या किंवा पाचव्या अवस्थेत काळे डाग शरीरावर दिसताच अशा प्रकारच्या अळ्या वेचून नष्ट करणे.
- २) बिजगुणन केंद्रात पण चौथ्या किंवा पाचव्या वाढीच्या अवस्थेतील रेशीम अळीच्या शरीरातून बाहेर पडणाऱ्या अशा अळ्या झाडूच्या सहाय्याने गोळा करून नष्ट कराव्यात.
- ३) बिजगुणन केंद्रात किंवा कोष बाजार पेठेत/गोदामात उडी माशी कोषात अंडी घालण्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी नायलॉन जाळीचे अच्छादन करावे.
- ४) बिजगुणन केंद्र किंवा प्रौढ संगोपन गृहात खिडकिया आतील व बाहेरच्या बाजूस पांढऱ्या ट्रे मध्ये दोन उडी साईडच्या गोळ्या प्रतिलीटर या प्रमाणे ठेवल्यास प्रौढ उडी माशीचा प्रवेशात अटकाव शक्य होतो.
- ५) शंभर अंडी पुंजासाठी ६ लिटर उडी साईड चौथ्या वाढीच्या अवस्थेत एक वेळा तर पाचव्या वाढीच्या अवस्थेत २ वेळा फवारणी आळयावर केल्यास उडी माशीने दिलेली अंडी नष्ट होतात.
- ६) पाचव्या वाढीच्या अवस्थेत तुळस (ओशिमम सॅक्टम) झाड पाला आर्काची फवारणी केल्यास उडीमाशी अळीवर अंडी घालत नाहीत.
- ७) संगोपन गृहात एक दिवस कोंबड्या सोडाण्यात यावे जेणे करून उडी माशीच्या सर्व अळ्या व प्युपा वेचून घेतील व खाऊन फस्त करतील.
- ८) जैविक नियंत्रण पध्दत-परोपजिवी (हायपर पॅरासाइट)



रेशीम किटक संगोपनातील रोगांचे व्यवस्थापन :

- संगोपनगृहात प्रवेश करताना साबणाने हात पाय स्वच्छ धुवावे. संगोपनगृहात वेगळी चप्पल वापरावी.
- रेशीम कीटकांची विष्ठा व खालेली पाने गोळा करून संगोपनगृहापासून दूर अंतरावर कंपोष्ट खड्यात टाकावी. संगोपनगृहात तिरपे वायुविजन व्यवस्था असावी.
- वेळोवेळी रोगीट अळ्या व पोचट कोष ट्रे मधून काढून टाकावे व सतत हात स्वच्छ धुवावे.
- आद्रता ९० टक्के च्या वर असल्यास दररोज सकाळी तुती पाला टाकण्याच्या अर्धा तास अगोदर ट्रे मध्ये रेशीम कीटकांवर चुना धुवळणी करावी म्हणजे रोग प्रसार न होता बंड कोरडे राहण्यास मदत होते.
- २ टक्के डायथेन एम-४५ किंवा कॅन्टन २० ग्राम व केओलिन १८० ग्राम मिक्स करून धुवळणी करावी.
- रेशीम कीटक कोषावर गेल्यानंतर २ च्या ते ३ च्या दिवशी प्लास्टिक चंद्रिकेवर कोष न करणाऱ्या अळ्या हॅन्डग्लोव घालून हाताने वेचून घ्याव्यात व जमिनीत गाडून टाकाव्यात.
- कोष काढणी रेशीम कीटक कोषावर गेल्याच्या नंतर कोष तयार झाल्याची खात्री करून ५ च्या दिवशी करावी.
- प्लास्टिक चंद्रिकेवर कोष करण्यासाठी सोडलेल्या अळ्यांच्या वरच्या बाजूस वर्तमान पत्राचे अच्छादन करावे म्हणजे रेशीम कीटक धागा वाया घालत नाही.
- प्लास्टिक ट्रे, चंद्रिका व इतर संगोपन साहित्य ६ x ४ x ३ फूट आकाराच्या सिमेंट कॉक्रीटच्या होदात ३० ग्रॅम चुना व ५०० ग्रॅम ब्लिचिंग पावडर १० लिटर पाण्यासोबत द्रावणात एक तास बुडवून ठेवावे म्हणजे निर्जंतुकीकरण होते व चंद्रिकेवरील रोगीट धागा विरघळतो.
- संगोपनगृहाच्या दाराजवळ गोणपाटाचे पायदान ठेवून त्याला पायपसून आत ये-जा करावी. आद्रता जास्त असल्यास ब्लिचिंग पावडर अधिक चुना मिश्रण शिंपडून घ्यावे.
- यशस्वी रेशीम कोष उत्पादनात ३८ टक्के वाटा उच्च प्रतीच्या तुती पाल्याचा वाटा असून ३७ टक्के संगोपन गृहातील तापमान व आद्रतेचा वाटा आहे. संगोपनगृहात २२ ते २८ सें. ग्रे. तापमान खालीलप्रमाणे ठेवणे आवश्यक असून आद्रता किंवा तापमान जास्त झाल्यास रेशीम कीटक रोगास बळी पडतात व कोष उत्पादनात घट येते.

अवस्था	तापमान (अंश से.)	आद्रता (टक्के)
पहिली	२७-२८	८५-९०
दुसरी	२६-२७	८०-८५
तिसरी	२५-२६	७५-८०
चौथी	२४-२५	७०-७५
पाचवी	२४-२५	६५-७०



ग्रासरी रोग

पांढरा मस्कार्डिन



हिरवा मस्कार्डिन

फ्लॅचरी रोग



अ.क्र.	परोपजिवी जैविक किटक नाव	मात्रा	निर्जंतुकिरणानंतर किती दिवसांनी नियंत्रणासाठी सोडावेत
०१	निझोलायनेक्स थायमस ट्रायचोप्रिया, एक्झोस्टिबिया फिलिपिनिस, टेप्टास्टिचस हावाडी, डायहिनस स्पे.	२ पाऊच प्रति १०० अंडिपुंज १० लक्ष प्रति १०० अंडिपुंज (चौथ्या वाढीच्या अवस्थेत : ८०००, पाचव्या वाढीच्या अवस्थेत : १६,००० व कोष काढणी केल्या नंतर ७६,००० प्रौढ जैविक किटक सोडावेत.)	संगोपनगृह निर्जंतुकिरण केल्यानंतर लगेच परोपजिवी किटक सोडता २ ते ३ दिवसांनी सोडावेत.



सुधारित बाजरी लागवड तंत्रज्ञान

बाजरी हे पीक हवामान, आहारातील पोषकता व जनावरांसाठी चारा इ. सर्वच दृष्टीकोणातून एक महत्वाचे पीक आहे.



ए.एच.बी.-१२०० एफ.ई.



ए.बी.पी.सी.-४-३



ए.एच.बी.-१२६९ एफ.ई.

प्रमुख तृणधान्यातील पोषक घटक

अ. क्र.	पिक	प्रथिने	मेद	कबोदके	खनिजे	उर्जा केलरी प्रति १०० ग्रॅ.	अ (IU)	ब-१ मि.ग्रॅ./ १०० ग्रॅ.	जीवनसत्त्वे १०० ग्रॅ.	निकोटिनिक आम्ल मि.ग्रॅ./ १००ग्रॅ.
१	मका	११.१	३.६	६६.२	१.५	३४२	१५०२	०.४२	०.१०	१.४
२	ज्वारी	१०.४	१.९	७२.६	१.६	३४९	७९	०.३७	०.२८	१.८
३	बाजरी	११.६	५.०	६७.५	२.३	३५६	२२०	०.३३	०.१६	३.२
४	गहू	१२.८	१.७	७१.२	१.५	३४६	१०८	०.४५	०.१२	५.०
५	भात	०६.८	०.५	७८.२	०.७	३४५	००	०.२१	०.०९	३.८

वार्षिक उत्पादनाचा विचार करता बाजरी हे जगातील ६ व्या क्रमांकाचे पिक आहे. देशाचा विचार करता भारतात प्रमुख पाच राज्यांमध्ये राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाणा या राज्यात ९५ टक्के क्षेत्रावर बाजरीचे उत्पादन घेतले जाते. महाराष्ट्र राज्यात बाजरी हे पिक प्रामुख्याने खरीप हंगामात घेतले जाते. बाजरी हे पिक नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, छ.संभाजीनगर, बीड, जालना व धारशिव या जिल्ह्यात प्रामुख्याने घेतले जाते.

सामान्यपणे हलक्या जमिनीत कोरडवाहू क्षेत्रांमध्ये जिथे अन्य तृणधान्य पिकत नाही तिथे बाजरीचे पिक घेतले जाते. आपल्या राज्यात खासकरून आदिवासीबहुल भागात लहान मुले आणि महिलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. कुपोषणामुळे महिलांची कार्यक्षमता घटल्याने त्याचे प्रतिकूल परिणाम कुटुंबांवरदेखील आढळून येतात. अशावेळी त्यांच्या दैनंदिन आहारात सकस बाजरीचा दैनंदिन वापर केल्यास कुपोषणाचे प्रमाण निश्चित कमी होईल तसेच शहरी नागरीकांचे आरोग्यदेखील सुधारेण.

महाराष्ट्रामध्ये बाजरी पिकाखालील क्षेत्र देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे असून उत्पादकतेमध्ये राज्याचा वाटा १७ टक्के आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ प्रवण क्षेत्रात गरीबांचे बाजरी हे मुख्य खाद्यपिक असून जनावरांचा सकस चारा आहे. बाजरी पिकामध्ये प्रथिने व लोहाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे बाजरीचा हिवाळी हंगामात आहारात आवर्जून वापर करावा. बाजरीची उत्पादकता आणखी वाढविण्यासाठी शास्त्रोक्त पध्दतीने लागवड करणे गरजेचे आहे.

जमिनीची निवड : बाजरी हे पीक हलक्या ते मध्यम जमिनीवर जेथे पावसाचे प्रमाण ४०० ते ७०० मि.मी. आहे अशा प्रदेशात घेतात. हे पीक शेतकरी हलक्या जमिनीत घेतात. खताचा कमी वापर, कमीत कमी मशागत, अंतरपिकाचा अभाव इ. मुळे बाजरीची उत्पादकता कमी आहे. बाजरीसाठी मध्यम ते भारी उत्तम पाणी निचरा होणारी जमिन निवडावी. अतिशय हलक्या जमिनीत बाजरी घेऊ नये. उन्हाळ्यात जमिनीची लोखंडी नांगराने १५ सें.मी. पर्यंत खोल नांगरत करावी त्यानंतर कुळवाच्या दोन पाळ्या देवून मशागत करावी. पेरणीच्या वेळी जमिन घट असावी, भुसभुशीत जमिनीत बाजरीची उगवण कमी होते.

पेरणीची वेळ : पावसाळा सुरु झाल्याबरोबर ७५ ते १०० सें.मी. पाऊस झाल्यास बाजरीची पेरणी करावी. पेरणी जुन महिन्यात चांगला पाऊस पडल्यावर करावी. पेरणी १५ जुन ते १५ जूलै या दरम्यान केल्यास अधिक उत्पादन मिळते. त्यानंतर पेरणीस जसजसा उशीर होईल तसतसा गोसावी, अरगट रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असते. उशीरा पेरणी झाल्यास उत्पादनात घट येते. आपातकालीन परिस्थितीत उशीरात उशीरा ३० जूलैपर्यंत बाजरी पिकाची पेरणी करावी.

बाजरीचे सुधारित वाण : महाराष्ट्रामध्ये बाजरी पिकाखालील क्षेत्र देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे असून उत्पादकतेमध्ये राज्याचा वाटा १७ टक्के आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ प्रवण क्षेत्रात गरीबांचे बाजरी हे मुख्य खाद्यपिक असून जनावरांचा सकस चारा आहे. बाजरी पिकामध्ये प्रथिने व लोहाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे बाजरीचा हिवाळी हंगामात आहारात आवर्जून वापर करावा. बाजरीची उत्पादकता आणखी वाढविण्यासाठी शास्त्रोक्त पध्दतीने लागवड करणे गरजेचे आहे.

वीज प्रक्रिया : सुरुवातीला बाजरीचे बी २० टक्के मिठाच्या द्रावणात टाकावे. वर तरंगणाऱ्या बुरशी पेशी व हलके बी काढून त्याचा नाश करावा, राहिलेले बी स्वच्छ पाण्याने धुवून सावलीत वाळवावे. त्यानंतर ऑर्गॅन-३५ डब्ल्यूएस (मेटालॅक्झील ३५ एसडी) या रासायनाची (४ ते ६ ग्रॅम प्रति किलो बियाणे) करावी व शेवटी ऑझोस्पीरीलियम व पीएसबी १० ते १५ ग्रॅम प्रति किलो प्रमाणे बिज प्रक्रिया करावी.

पेरणी पध्दत : बाजरीची पेरणी हलक्या पाभरीने दोन ओळीत ४५ सें.मी. अंतर व दोन रोपातील / झाडातील १० ते १२ सें.मी. अंतर ठेवून करावी. पेरणीसाठी ३ किलो प्रति हेक्टर बियाणे वापरावे. पेरणी ३ ते ४ सें.मी. पेक्षा जास्त खोल करून नये. बाजरीची हेक्टरी १.८ ते २ लाख ताटे / झाडांची संख्या ठेवावी. पेरणीनंतर १५ दिवसांनी विरळणी करावी. मध्यम उताराच्या जमिनीवर उतारास आडवी १५ ते २० सें.मी. खोल सरी करून सरीमध्ये पावसाचे पाणी साठवावे व वापसा असल्यास सरीमध्ये बाजरीची पेरणी केल्यास नेहमीच्या पध्दतीपेक्षा धान्याचे व चान्याचे अधिक उत्पादन मिळते.

खत व्यवस्थापन : जमिनीचे माती परीक्षण करून त्यानुसार खताची मात्रा ठरवावी. हलक्या जमिनीत ४० किलो नत्र व २० किलो स्फुरद प्रति हेक्टर घ्यावे. मध्यम जमिनीत प्रति हेक्टर ६० किलो नत्र, ३० किलो स्फुरद व ३० किलो पालाश खताची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यापैकी ३० किलो नत्र, ३० किलो स्फुरद व ३० किलो पालाश पेरणीच्या वेळी घ्यावे व राहिलेले ३० किलो नत्र पेरणीनंतर एक महिन्याने द्यावे.

खत व्यवस्थापन :

पध्दत	खते	१ महिन्यानी (किलो प्रति एकर)
पध्दत-१	युरिया ३० किलो + एस.एस.पी ७५ किलो + एम.ओ.पी. २० किलो	३० किलो युरिया
पध्दत-२	१५:१५:१५- ८० किलो	३० किलो युरिया
पध्दत-३	१९:१९:१९- ६५ किलो	३० किलो युरिया
पध्दत-४	१०:२६:२६- ५० किलो + २० किलो युरिया	३० किलो युरिया
पध्दत-५	१८:४६:००- २५ किलो + १५ किलो युरिया + २० किलो एम.ओ.पी	३० किलो युरिया
पध्दत-६	२०:२०:००- ६० किलो + २० किलो एम.ओ.पी	३० किलो युरिया

डॉ. एस.बी.पवार

सहयोगी संशोधन संचालक,
मो. : ९४२२१७८९८२

डॉ.सी.बी. पाटील

सहाय्यक प्राध्यापक,
कृषि विद्या
मो. : ७०५८५४१६७९

डॉ. ए.बी. बागडे

सहाय्यक प्राध्यापक,
कृषि वनस्पतीशास्त्र
मो. : ९८२२७०२७३

राष्ट्रीय कृषि संशोधन प्रकल्प, छत्रपती संभाजी नगर

बाजरीचे सुधारित वाण :

अ. क्र.	वाण	धान्य उत्पादन (कि/हे.)	कडबा उत्पादन (कि/हे.)	वैशिष्ट्ये
सरळवाण				
१	ओआयएमपी-९२९०१ (समुध्दी)	२५-२८	३५-४०	उंच वाढतो, हिरवट टपरे दाणे, उत्तम भाकरी.
२	एबीपीसी-४-३	२५-२७	५०-५५	मध्यम उंची, गोसावी रोग प्रतिकारक, हा सरळ वाण खरीप व उन्हाळी हंगामास उत्तम आहे.
३	धनशक्ती	२२	५०-६०	लवकर तयार होणारा वाण, रोगप्रतिकारक, अधिक लोह ८१ पीपीएम व जस्ताचे प्रमाण ४४ पीपीएम.
संकरवाण				
१	शांती	३०-३५	५०-५५	गोसावी रोग प्रतिकारक.
२	आरएसआरबीएच ८६०६(श्रध्दा)	२५-३०	४५-५०	हलक्या व कमी पावसाच्या प्रदेशासाठी योग्य.
३	आरएसआरबीएच ८९२४ (सबुरी)	३५-४०	५०-५५	कणीस घट्ट व केसाळ.
४	एएचबी-१२०० Fe (लोहयुक्त)	३०-३२	६५-७०	गोसावी व करपा रोगास प्रतिकारक, घट्ट कणीस व टपरे दाणे, वाणामध्ये लोहाचे प्रमाण ८८ पीपीएम व जस्ताचे प्रमाण ४३ पीपीएम असून संपुर्ण देशात प्रसारीत करण्याची शिफारस करण्यात आली.
५	एएचबी-१२६९ (लोहयुक्त)	३१-३४	७२-७५	गोसावी व करपा रोगास प्रतिकारक, घट्ट कणीस व टपरे दाणे तसेच रंग हिरवट असून फुटव्याचे प्रमाण जास्त, हया वाणामध्ये लोहाचे प्रमाण ९१ पीपीएम व जस्ताचे प्रमाण ४५ पीपीएम.

तण व्यवस्थापन : बाजरी पिकाची दोन वेळा खुरपणी व कोळपणी करून तण नियंत्रण करावे. तणनाशकाचा वापर करायचा झाल्यास हलक्या जमिनीत अँट्राझीन ०.५-०.७ किलो प्रति हेक्टर तर मध्यम ते भारी जमिनीसाठी १.० किलो प्रति हेक्टर ७०० लिटर पाण्यात मिसळून पीक पेरणीनंतर परंतु पीक उगवण्यापूर्वी जमिनीवर फवारावे.

पाणी व्यवस्थापन : बाजरी पिकास फुटते फुटतांना, पिक पोटीत असतांना व फुलोरा अवस्थेत पावसाचा ताण पडल्यास व पाणी देण्याची सोय असल्यास पाणी द्यावे. कोरडवाहू बाजरी पिकात २ ओळी नंतर बळीराम नांगराने उथळ चर काढावेत म्हणजे पडलेल्या पावसाचे संवर्धन होण्यास मदत होते.

रोग व्यवस्थापन :

केवडा : या रोगास गोसावी असे म्हणतात. या रोगाची लक्षणे पिकांच्या वाढीच्या सर्वच अवस्थेत दिसून येतात. बियाणेद्वारे, जमिनीत असलेल्या बुरशीपासून या रोगाची लागण होते. रोप अवस्थेत प्रादुर्भाव झाल्यास पाने पिवळी पडतात. नंतर ही पाने पांढरे होतात, कालांतराने तपकिरी, विटकरी रंगाची दिसू लागतात व नंतर करपू लागतात. रोगट पानांची सहसा वाढ होत नाही. अशा प्रकारच्या रोपावरील कणसामध्ये दाणे न भरता कणसामध्ये पर्णमय केसाळ वाढ होते. या रोगाची जिवाणू तीन वर्षांपर्यंत जिवंत राहू शकतात.

रोग नियंत्रण : ऑर्गॅन (मेटालॅक्झील ३५ एसडी) या बुरशीनाशकाची बिज प्रक्रिया (६ ग्रॅम प्रति किलो) पेरणीपूर्वी करावी. कॉपर ऑक्सीक्लोराईड ५० टक्के या पाण्यात मिसळल्यास बुरशी नाशकाचा १००० ग्रॅम प्रति हेक्टर ५०० लिटर पाण्यात टाकून पिक २० दिवसाचे झाल्यावर फवारावे त्यामुळे रोगाचे नियंत्रण होते. शिफारस केलेल्या खताच्या मात्रा देणे आवश्यक आहे, त्यामुळे रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते. पिकाची द्विदल धान्याच्या पिकांबरोबर फेरपालट केल्यास बुरशीचे प्रमाण कमी करता येईल.

अरगट / चिकटा : बुरशीची वाढ कोवळ्या बिजांड कोषात होते त्यामुळे दाणे भरण्याऐवजी त्यातून सुरुवातीला मधा सारखा चिकट द्रव पाझरतो. याकडे सर्व माशा आकर्षित होतात व त्यातून या रोगाचा प्रसार होतो. प्रतिकूल हवामान असले म्हणजे हा द्रव जेथून बाहेर पडतो तेथेच बुरशीचे रुपांतर रोगपेशीत होते. या रोग पेशी धान्याबरोबर दळल्या गेल्यास व माणसाच्या खाण्यात आल्यास विषबाधा होवून जुलाब होतात व प्रसंगी मृत्यू येण्याचा संभव असतो.

रोग नियंत्रण : पेरणीपूर्वी बियाणस २० टक्के मिठाच्या द्रावणात बुडवावे, तरांगारे हलके बी बाहेर काढून त्याचा जाळून नाश करावा. नंतर तळाशी राहिलेले बी बाहेर काढून स्वच्छ पाण्याने तीन वेळा धुवून सावलीत वाळवून नंतर पेरणीसाठी वापरावे. अरगट रोगाची कणसे दिसताच अशी ताटे उपटून त्याचा नाश करावा. पिकाची फेरपालट करावी किंवा रोगग्रस्त शेतात किमान दोन ते तीन वर्षे बाजरी पिक घेण्याचे टाळावे, तसेच खोल नांगरत करावी. कणीस निसवत असताना बाँविस्टीन ०.१ टक्के बुरशी नाशकाची फवारणी करावी. तसेच रोगाची तिब्रता जास्त असेल तर १५ दिवसानंतर दुसरी फवारणी करावी किंवा मॅकाझेब (डायथेन एम-४५) ४७ टक्के १२५० ग्रॅम प्रति हेक्टर ५०० लिटर पाण्यात टाकून फवारावे.

कीड व्यवस्थापन :

१) हिंणे अथवा भुंगे : ही कीड काळ्या रंगाची असून पंखावर पिवळट तपकिरी पट्टे असतात.

२) सिटोनीड भुंगे : या कीडीचा प्रादुर्भाव मागील काही वर्षांपासून जास्त प्रमाणात आढळून येत आहे. भुंगे गोलाकार तांबूस रंगाचे असून पाठीवर पांढऱ्या रंगाचे पट्टे/चट्टे असतात. भुंग्याची हालचाल मंद असते. पीक फुलोऱ्यात असताना फुलांचे व कोवळ्या दाण्याचे चुकसान ही दोन्ही भुंगे करतात.

उपाययोजना

१. हिंणे तसेच सिटोनीड भुंगे जमा करून रॉकेल मिश्रीत पाण्यात टाकून नाश करावे.

२. प्रकाश सापळ्यांचा उपयोग करावा.


३. जमिनीतील अळया, कोष उन्हात येण्यासाठी पीक काढणी नंतर हिवाळी खोलगत नांगरत करावी.

४. मोसमी पाऊस सुरु होण्यापूर्वी शेताची व बांधाची स्वच्छता करून नंतर कीटकनाशक मिथील पॅराथिऑन २ टक्के भुकटी (२० कि.ग्रॅ. / हेक्टर) धुरळणी करावी.

५. कणसावरील भुंग्याच्या नियंत्रणासाठी वरीलप्रमाणे भुकटीचा उपयोग करावा.

३) बनपंखी टोळ : टोळ लहान व मोठे बिनपंखी असतात. डोळे निमूळते व टोकदार असतात. शरीर लांबट असून हिरवट व गवती रंगाचे असते व डोळ्याभोवती पिवळे पट्टे असतात. टोळ पाणे कुरतडून खातात. यांचा जास्त प्रमाणात प्रादुर्भाव झाल्यास कीडग्रस्त शेतजमीन नांगरून टाकावी. बांध उन्हाळ्यात स्वच्छ करून खरडून ठेवावेत त्यामुळे अंडे उघडी पडतात व त्यास पाखरे वेचून खातात. बांधावर तसेच पडीत जमिनीवर मिथील पॅराथिऑन २ टक्के भुकटी अथवा (२० कि.ग्रॅ./हेक्टर) धुरळणी करावी. बाजरी हे अधिक उर्जा व खनिज मानवी शरिरास पुरवते त्यामध्ये Biofortified (जैवसंपन्न) नवीन संकरीत बाजरीचे दोन वाण वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठा, परभणी अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि संशोधन प्रकल्प, छ. संभाजीनगर व ICRISAT यांच्या सहाय्याने विकसीत करण्यात आले.

* * * * *



* * * * *



बीटी कापसाची लागवड आणि व्यवस्थापन

महाराष्ट्रातील कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांचे नगदी पीक म्हणून कापूस पीकाकडे पाहिले जाते. खरीप हंगामातील एकूण क्षेत्रापैकी जवळपास २७% क्षेत्र एकट्या कापूस पीकाखाली येते. तथापी या पिकाची उत्पादकता पाहता देशाच्या उत्पादकतेपेक्षा जवळपास ३०% कमी आहे. राज्यातील कापूस पिकाचे क्षेत्र जवळपास १०% क्षेत्र कोरडवाहू लागवडीमध्ये आहे. शिवाय पावसाचा अनियमितपणा, योग्य लागवड पद्धतीचा अभाव आणि कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे राज्यातील कापूस पीकाची उत्पादकता कमी येते. प्राप्त परिस्थितीमध्ये उत्पादकता वाढविण्यासाठी आधुनिक लागवड तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते.

जमीन : कापूस पिकाची लागवड मध्यम ते भारी जमिनीमध्ये करावी. या पिकाकरीता पाण्याचा उत्तम निचरा होणाऱ्या जमीनीची गरज असते. हलक्या जमिनीत लागवड केल्यास उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट येते.

पिकांची फेरपालट : पिकांपासून सातत्यपूर्ण उत्पादन मिळण्यासाठी पीक फेरपालट करणे आवश्यक आहे. बरेच शेतकरी एकाच जमिनीवर दीर्घकाळापासून कापूस हे एकच पीक घेतात. परंतु अशा जमिनीमध्ये कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढतो तसेच पिकाचे उत्पादन देखील कमी येते. म्हणून पीक फेरपालट करणे नितांत आवश्यक आहे. त्याकरीता पिकपद्धतीप्रमाणे बागायती लागवडीमध्ये गहू, भूईमूग या पिकांनंतर कापसाची लागवड करावी तर कोरडवाहू लागवडीमध्ये ज्वारी, सोयाबीन या पिकांनंतर कापसाचे पीक घ्यावे.

बीटी कापूस वाणाची निवड : कापूस पीकाच्या लागवडीमध्ये शेतकऱ्याच्या वतीने सर्वाधिकपणे विचारण्यात येणारा प्रश्न म्हणजे कापूस पिकाच्या कोणत्या बीटी वाणाची लागवड करावी. बाजारामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या वाणांपैकी लागवडीकरीता वाण निवडतांना खालील बाबी विचारात घ्याव्या.

- रस शोषण करणाऱ्या कीडी व रोगांना सहनशील असावा जेणेकरून कीड - रोग व्यवस्थापनावरील खर्च कमी करता येईल.
- कोरडवाहू लागवडीसाठी वाण पाण्याचा ताण सहन करणारा असावा.
- सधन लागवडीसाठी आटोपशीर ठेवण (उंची व फांद्यांची लांबी कमी) असणारा वाण निवडावा.
- लागवडीसाठी निवडण्यात येणारा वाण आपल्या भागामध्ये अधिक उत्पादन देणारा असावा.
- त्याचे धाग्याचे गुणधर्म सरस असावे.
- कोरडवाहू लागवडीसाठी बीटी कपाशीचा वाण कमी (१४०-१५० दिवस) ते मध्यम (१५०-१६० दिवस) कालावधीचा असावा. तर बागायती लागवडीसाठी बीटी वाणाचा कालावधी १६० ते १८० दिवस असावा.
- बोंडाचा आकार कोरडवाहूसाठी मध्यम (३ ते ४ ग्रॅम) तर बागायतीसाठी मोठा (४ ग्रॅम) असावा.

विद्यापीठाचे प्रसारीत बी.टी. वान : एन.एच.१९०१ बी.टी., एन.एच.१९०२ बी.टी., एन.एच.१९०४ बी.टी.

लागवडीची वेळ : लागवडीच्या वेळेवर कपाशीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. मराठवाड्यामध्ये पूर्वहंगामी (बागायती) कापूस पीकाची ठिबक सिंचन पद्धतीने लागवड १ ते ७ जून या काळात (तापमान ३९° पेक्षा कमी झाल्यावर) करावी तर मान्सूनचा ७५-१०० मिमी पाऊस झाल्यावर कोरडवाहू कपाशीची लागवड करावी.

लागवडीचे अंतर :

बागायती :

१८०x३० सेंमी (६x१ फुट) किंवा १५०x३० सेंमी (५x१ फुट) जोड ओळ पद्धत : १२० - ६० x ६० सेंमी (४-२ x १ फुट) कोरडवाहू : १२० x ४५ सेंमी (४ x १.५ फुट)

बीज प्रक्रिया : बीटी कापूस बियाण्यास कीटकनाशकाची बीजप्रक्रिया केलेली असते. तथापी बियाणेजन्म रोगांचा प्रतिकार करणे व अन्नद्रव्य उपलब्ध करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे बुरशीनाशक व जीवाणूसंवर्धकांची बीजप्रक्रिया करावी.

बुरशीनाशक : सुडोमोनास फ्लुरोसन्स १० ग्रॅम प्रति किग्रॅ बियाणे किंवा कार्बेन्डेझीम ३ ग्रॅम प्रति किग्रॅ बियाणे - मर व करपा रोगांचा प्रादुर्भाव कमी होण्यासाठी.

जीवाणूसंवर्धक : अँट्रोटोबॅक्टर (नत्र स्थिरिकरण) व स्फुरद विद्राव्य करणारे जीवाणू (अविद्राव्य स्फुरद विद्राव्य करण्यासाठी) मात्रा - द्रव स्वरूपातील जीवाणू संवर्धक १० मिली प्रति किग्रॅ बियाणे. बुरशीनाशकाची प्रक्रिया केल्यानंतरच जीवाणू संवर्धकाची बीज प्रक्रिया करावी.

आंतरपीके : कापूस पीकापासून अधिक व सातत्यपूर्ण उत्पन्न मिळवायचे असेल तर त्यामध्ये आंतरपीके घेणे आवश्यक आहे. शिवाय आंतरपीकामुळे जमिनीची धूप कमी होते, पाणी मुण्याचे प्रमाण वाढते, कडधान्य वर्गीय आंतरपीकांमुळे नत्र स्थिरिकरण होते व जमीनीमध्ये सेंद्रीय कर्बाचे प्रमाण वाढते. कापूस पीकामध्ये कापूस + मूग (१:१), कापूस + उडीद (१:१), कापूस + सोयाबीन (१:१), रुंद ओळीमध्ये कापूस + मूग (१:२) किंवा कापूस + तूर (४-६:१ किंवा ६-८:२) या आंतरपीक पद्धती फायदेशीर आढळून आहेत.

एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन :

सेंद्रीय खतांचा वापर : पूर्वमशागतीच्या काळात शेवटच्या वखर पाळीपूर्वी कोरडवाहू लागवडीसाठी ५ टन शेणखत तर बागायतीसाठी १० टन शेणखत प्रति हेक्टर टाकून मातीमध्ये समप्रमाणात मिसळावे.

रासायनिक खतांची मात्रा व विभागणी :

बीटी कापूस पिकासाठी रासायनिक खतांची जमिनीद्वारे द्यावयाची मात्रा (नत्र, स्फुरद व पालाश कि. ग्रा. / हेक्टर)

विभाग	खते देण्याची वेळ	कोरडवाहू			बागायती		
		नत्र	स्फुरद	पालाश	नत्र	स्फुरद	पालाश
मराठवाडा	लागवडीच्या वेळी	४८	६०	६०	३०	७५	७५
	३० दिवसांनी	३६	-	-	६०	-	-
	६० दिवसांनी	३६	-	-	६०	-	-
	एकूण	१२०	६०	६०	१५०	७५	७५

ठिबक संचाद्वारे देण्यासाठी रासायनिक खतांची मात्रा :

खते देण्याची वेळ	नत्र	स्फुरद	पालाश
मराठवाडा विभाग :			
लागवडीच्या वेळी	१२	८	८
२० दिवसांनी	१६	८	८
४० दिवसांनी	१६	८	८
६० दिवसांनी	१२	८	८
८० दिवसांनी	१२	८	८
१०० दिवसांनी	१२	८	८
एकूण	८०	४०	४०

विद्राव्य खत	फवारणीसाठी पिकाची अवस्था / वेळ	वेळ (दिवस)	प्रमाण प्रति १० लिटर पाणी
युरिया	वाढीची अवस्था	३०-४०	२०० ग्रॅम
डीएपी	फुले लागणे	६०-६५	२०० ग्रॅम
मॅग्नेशियम सल्फेट	पाते लागणे ते बोंडे लागणे	४५ व ७५	२० ग्रॅम
पोर्टिशियम नायट्रेट (१३:०:४५) किंवा पोर्टिशियम शुनाईट	फुले लागणे व बोंडे भरणे	६० व ९०	२०० ग्रॅम किंवा ५० ग्रॅम
बोरॉन	फुले लागणे ते बोंडे लागणे	७०-८०	१० ग्रॅम
सूक्ष्म अन्नद्रव्य मिश्रण ग्रेड २	फुले लागणे ते बोंडे लागणे	६५ - ९०	५० ग्रॅम

सूक्ष्म अन्नद्रव्य :

मातीचे परिक्षण करून ज्या अन्नघटकाची कमतरता आहे त्या

अन्नघटकाचा खालीलप्रमाणे मातीद्वारे पुरवठा करावा.

- सल्फर - २० कि.ग्रॅ. / हेक्टर
- मॅग्नेशियम - मॅग्नेशियम सल्फेट - २० कि.ग्रॅ. / हेक्टर
- जस्त - झिंक सल्फेट - २५ कि.ग्रॅ. / हेक्टर
- ट्रायकोडर्मा व्हिरिडी - २.५ लिटर/हेक्टर (आळवणी)
- बोरॉन - बोरॅक्स - ५ कि.ग्रॅ. / हेक्टर

अन्नद्रव्यांची फवारणी : अन्नद्रव्यांची फवारणी केल्यामुळे पीकाच्या वाढीवर गरजेच्या काळात अन्नद्रव्यांचा पुरवठा करता येतो. त्यासाठी फवारणी करावयाचे विद्राव्य खत, फवारणीची वेळ व १० लिटर पाण्यासाठी विद्राव्य खताचे प्रमाण पुढील प्रमाणे वापरावे.

तणनाशके :

वापरावयाची वेळ	तणनाशक	बाजारातील घटकाचे प्रमाण	फवारणीची पद्धत
उगवणीपूर्व	पेंडीमिथालीन	२.५ - ३.३ लिटर प्रति हेक्टर (२५ - ३३ मिली प्रति १० लीटर पाणी)	लागवडीनंतर परंतु उगवणीपूर्वी ओलसर जमिनीवर समप्रमाणात फवारावे
उगवणी पश्चात	पायरीथायोबॅक सोडिअम (गोल पानाच्या तणांकरीता उपयुक्त)	६२५ मिली प्रति हेक्टर (१२.५ मिली)	लागवडीनंतर २१ ते २८ दिवस किंवा तणे २-४ पानावर असतांना
	क्वुझॅलोफॉफ इथाइल (लांब पानाच्या गवतवर्गीय तणांकरीता उपयुक्त)	५०० मिली प्रति हेक्टर (१० मिली प्रति १० लीटर)	

उगवणीपश्चात तणनाशके वापरातांना दोन्ही प्रकारच्या तणांचा प्रादुर्भाव असल्यास दोन्ही उगवणीपश्चात तणनाशके फवारणी करतांना एकत्र मिसळून फवारावी.

वाढ व्यवस्थापन :

कापूस पीकाची कायिक वाढ जास्त झाल्यास अन्नद्रव्यांचा वापर झाडांच्या कायिक वाढीसाठी होतो व परिणामी बोंडांची वाढ कमी होते. त्यामुळे उत्पादनामध्ये घट होऊ शकते. शिवाय त्यामुळे पिकाची वाढ अवास्तव होऊ देऊ नये. त्याकरीता खालीलपैकी कोणत्याही एक प्रकारे वाढ सिमीत ठेवता येते.

१. मॅपीबॅट क्लोराईड या वाढरोधकाची फवारणी पीक पाते लागणे ते फुले लागण्याच्या काळात मातीमध्ये ओल असतांना व त्यानंतर १५ दिवसांनी फवारणी करावी. प्रमाण १२ मिली प्रति १० लिटर.

२. शेंडा खुडणे हा सर्वाधिक स्वस्त व करण्यासाठी अगदी सोपा पर्याय आहे. लागवडीनंतर १००-११० दिवसांनी किंवा पीक ५ फुट उंचीचे झाल्यावर झाडाची शेंडे खुडावेत.



कापूस : नांदेड ४४



कापूस : पी.ए. ७४०

कापूस : एन.एच.एच. ७१५

कडधान्य पिकांमध्ये तुर पिकाचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आहे. भारतीय लोकांच्या आहारात कडधान्य पिकांचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे. तसेच जमिनीची उत्पादकता व पोत कायम राखून अधिक उत्पादन मिळत राहण्यासाठी विविध पीक पध्दतीमध्ये कडधान्य पिकांना नव्याने महत्त्व प्राप्त होत आहे. महाराष्ट्र राज्यात सन २०२२-२३ या कालावधीत तुरीची लागवड ११.७५ लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर केली होती आणि एकूण उत्पादन ८.४८ लाख टन होते व त्यापासून प्रति हेक्टर ७२२ किलो उत्पादकता होती.

बदलते हवामान कमी पर्जन्यमान असून सुद्धा तुर पिकापासून भरपूर उत्पादन मिळते त्यामुळे तुरीचे पीक नगदी पिक म्हणून घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल दिसून येत आहे. तुर पिकाच्या उत्पादनामध्ये चढ उतार होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे तुरीची लागवड मुख्यतः कोरडवाहू पध्दतीमध्ये करणे. तसेच स्थानिक, जास्त कालावधीच्या व कमी उत्पादन क्षमता असलेल्या वाणांची लागवड करणे. तसेच स्थानिक वाण रोगांना बळी पडून उत्पादनात घट आढळून येते, पेरणीच्या वेळी बीजप्रक्रिया न करणे, जमिनीची पध्दतशीर मशागत, खत पुरवठा, पाणी व्यवस्थापन, झाडांची योग्य संख्या, तण व्यवस्थापन याकडे पुरेसे लक्ष न देणे ही आहेत. तुरीच्या अधिक उत्पादनासाठी लागवडीची महत्वाची सुत्रे खालील प्रमाणे आहेत.

जमीन : तुर या पिकास मध्यम ते भारी ३० ते ४५ से.मी. खोल, पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी जमीन आवश्यक असते. तुर पिकाची चोपन व क्षारयुक्त जमीनीमध्ये लागवड करू नये. पिकाच्या वाढीस जमिनीचा सामू ६.५० ते ७.५० असावा. आम्लयुक्त जमिनीत पिकांच्या मुळावरील गाठीची योग्य वाढ होत नसल्याने रोपे पिचळी पडतात.

हवामान : तुर पिकांस २१ ते २४ अंश सें. सरासरी तपमान चांगले मानवते. तूर पिकांस ७००० ते १०००० मिली मिटर वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान असावे लागते. मात्र पेरणी नंतर पहिल्या एक ते दिड महिन्यांच्या कालावधीत नियमित पाऊस असणे फायद्याचे ठरते. फुले व शेंगा भरण्याच्या कालावधीत कोरडे व समशीतोष्ण हवामान या पिकास आवश्यक आहे. अधिक पर्जन्यमान असलेल्या भागांमध्ये शेतात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

पूर्वमशागत : तुरीची मुळे खोलवर जात असल्यामुळे जमीन खोल नांगरून वखराच्या दोन ते तीन पाळ्या देऊन जमीन भुसभुशीत करावी. आंतरपीक घ्यावयाचे झाल्यास मुख्य पिकांसाठी केलेली मशागत या पिकांसाठी उपयोगी पडते. उत्तम प्रकारच्या मशागतीमुळे मुळांची वाढ चांगली होते. शेवटच्या वखराच्या पाळीच्या अगोदर हेक्टर १५-२० गाड्या कुजलेले कंपोस्ट खत/शेणखत जमिनीत चांगले मिसळावे.

सुधारीत वाण : तुरीच्या अधिक उत्पादनासाठी सुधारीत वाणांची निवड करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

पेरणीची वेळ : समाधानकारक पाऊस ७५ ते १०० मि.मी. पडल्यानंतर वापसा येतात तुरीची पेरणी करावी. पेरणीस उशीर झाल्यास उत्पादनात घट येते. तुरीची पेरणी १५ जुलै पुर्वी संपवावी. पेरणीस १५ दिवस उशीर झाल्यास २५ ते २७ टक्के व ३० दिवसांचा विलंब झाल्यास ५० ते ५८ टक्के घट येते. तुरीची धुळ पेरणी केल्यास उत्पादनात २० ते २५ % वाढ होऊ शकते.

बीजप्रक्रिया : अत्यल्प खर्चात अधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी बीजप्रक्रिया खालील प्रमाणे करावी.

१. पेरणीपूर्वी २.५ ग्रॅम थायरम किंवा बाक्स्टीन २ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास चोळावे यामुळे जमिनीतून उद्भवणाऱ्या विविध रोगांपासून पिकाचा बचाव होतो.

२. पेरणीपुर्वी प्रति किलो बियाण्यास १० ग्रॅम ट्रायकोडर्माची बिजप्रक्रिया

करावी. या नंतर २५० ग्रॅम रायझोबीयम १० किलो बियाणास गुळाच्या थंड द्रावणातून चोळावे. असे बियाणे तासभर सावलीत सुकवावे आणि मग पेरणी करावी यामुळे पिकाचे रोग आवस्थेत जमिनीद्वारे उद्भवणाऱ्या बुरशीजन्य रोगांपासून संरक्षण होते. तसेच रायझोबियम जीवाणु संवर्धनामुळे पिकाच्या मुळावरील कार्यक्षम गाठीच्या संख्येत वाढ होऊन हवेतील नत्राचे स्थिरीकरण होऊन त्याचा लाभ ह्या पिकास तसेच तद्दर येणाऱ्या पिकाला होतो.

३. स्फुरद विरघळणारे जिवाणु संवर्धक (पी.एस.बी.) २५० ग्रॅम प्रति १० किलो बियाण्यास योग्य प्रकारे लावल्यास जमिनीतील स्थिर झालेला स्फुरद उपलब्ध होण्यास मदत होऊन उत्पादनात वाढ होऊ शकते.

पिकांची पेरणी, अंतर व हेक्टरी बियाणे : जिरायत लागवडी करिता दोन ओळीतील आंतर १० सेंमी व दोन रोपातील अंतर २०-३० सें.मी. एवढे ठेवावे. हेक्टर १२ ते १५ किलो बियाणे पुरेसे होते. बियाणे ४ ते ५ सें.मी. खोल पडेल अशा प्रकारे पेरणी करावी. बागायतीसाठी एके ठिकाणी दोन ते तीन बिया टाकून १० X १० सेंमी टोकन पध्दतीने लागवड करावी. टोकण ५ ते ६ किलो प्रति हेक्टरी बियाणे पुरेसे होते. जमिनीच्या प्रकारानुसार व उपलब्ध पाण्यानुसार अंतर वाढवावे.

आंतरपीक : तुरीचे प्रचलित क्षेत्र आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी तसेच जमिनीची उत्पादकता राखण्यासाठी तुर व बाजरी २:४, तूर व ज्वारी ३:३ किंवा २:४, तूर व सोयाबीन/मुग/उडीद १:२ किंवा २:४ ओळीचे प्रमाण ठेवून आंतरपीक पध्दतीचा वापर केल्यास अधिक फायदा होतो.

रासायनिक खते : तुरीच्या पिकांची जोमदार वाढ होण्यासाठी पेरणीच्या वेळी हेक्टर २५ किलो नत्र आणि ५० किलो स्फुरद पेरणी बरोबर दोन चाकाच्या पाभरीने द्यावे. जमिनीच्या पृथःकरणात कमतरता आढळल्यास हेक्टर ३० किलो पालाश वापरावे. त्याशिवाय हेक्टर २० ते २५ किलो गंधक जिप्सममधून वापरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पण स्फुरद सिंगल सुपर फॉस्फेट मधून दिल्यास त्यातील १२.५ टक्के गंधकाचा तुर पिकास उपयोग होतो. जमिनीत जस्ताची कमतरता भासल्यास पेरणी पुर्वी प्रति हेक्टर १५ किलो झिंक सल्फेट वापरल्याने उत्पादनात २५ टक्के वाढ झाल्याची संशोधनाचे निष्कर्ष आहेत. कोरडवाहू तूर पिकांमध्ये २ टक्के युरिया पीक फुलावर येत असताना फवारणी केल्यास फायदा होतो.

आंतरमशागत : तुरीचे पीक सुरुवातीच्या काळात (३०-४० दिवस) अतिशय सावकाश वाढते यामुळे सुरुवातीच्या काळात तणांचा प्रादुर्भाव जास्त जाणवतो. पीक २० ते २५ दिवसांचे असताना पहिली आणि त्यानंतर ३० ते ३५ दिवसाचे असताना दुसरी कोळपणी करावी. तुरीचे पीक पेरणी पासून ४५ दिवसापर्यंत तण विरहीत ठेवल्यास उत्पादनात लक्षणीय वाढ होते. पेरणी नंतर व पीक उगवणीपुर्वी स्टॅम्प (पेंडीमिथीलीन) १.५० किलो किंवा मेटाक्लोर (डबुयल) हे तण नाशक २ किलो १००० लिटर पाण्यात मिसळून जमिनीवर समप्रमाणात फवारावे. यामुळे सुरुवातीच्या काळात येणाऱ्या तणांचा चांगला बंदोबस्त करता येतो.

पाणी व्यवस्थापन : तूर पिकास सुरुवातीच्या काळात १५ ते २० दिवस आणि शेंगा तयार होण्याच्या काळात २५-३० दिवस पाण्याचा ताण पडल्यास पाणी देणे आवश्यक आहे. विशेषतः पिक फुलोऱ्यात असताना आणि शेंगात दाणे भरतानाचा कालावधी अत्यंत संवेदनशील आहे. या पिकांमध्ये पुढील तीन अवस्था पाण्यासाठी संवेदनशील आहेत. १. कळया धरताना २. फुलोऱ्यात ३. शेंगात दाणे भरताना या अवस्थेत जमिनीत ओलावा नसल्यास पाण्याच्या पाळ्या देणे आवश्यक आहे. तूर पिकासाठी सरी वरंभा पध्दतीची जमीन बांधणी करावी. त्यामुळे पाणी देणे सुलभ होते किंवा पावसाचे पाणी अधिक झाल्यास सरीतून निचरा होतो.

कीड नियंत्रण : तुरीच्या पिकांवर सुरुवातीच्या काळात मावा, फुलकीडे व तुडतुडे हे रसशोषण करणाऱ्या कीडींचा प्रादुर्भाव होतो. या कीडींचा प्रादुर्भाव

वाढल्यास डायमिथोएट (३० टक्के प्रवाही) ५०० मि.ली. अथवा क्विन्तॉलफॉस (२५ टक्के प्रवाही) १००० मि.ली. ५०० लिटर पाण्यात मिसळून प्रति हेक्टरी फवारावे. तुरीच्या पिकांचे खरे आर्थिक नुकसान पीक फुलोऱ्यात आणि शेंगा भरण्याच्या काळात शेंगा पोखरणारी अळी, पिसारी पंतगांची अळी आणि शेंगाभाशी अशा तीन प्रकारच्या अळीमुळे तुरीच्या उत्पादनात घट येते. या किडीच्या नियंत्रणासाठी खालील प्रमाणे एकात्मिक किड नियंत्रण या पध्दतीचा अवलंब करावा.

१. उन्हाळ्यात खोल नांगरणी करावी म्हणजे शेंगा पोखरणारी अळीची सुमावस्था पक्षी व सूर्याच्या उष्णतेमुळे नष्ट होते.

२. बांधावरील तणे आणि किडग्रस्त शेंडा काढून तसेच मोठ्या अळ्या वेचून नष्ट कराव्यात.

३. पाच टक्के निंबोळी अर्क आणि २ टक्के साबणाचा चुरा या मिश्रणाची दोन फवारणी १५ दिवसांच्या अंतराने शेंगा पोखरणारी अळीच्या नियंत्रणासाठी करावी.

४. क्रायसोपा या भक्षक किडीची ५० हजार अंडी प्रति हेक्टर किंवा ट्रायकोग्रामा या परोपजीवी किडीची १.५ लाख अंडी प्रति हेक्टर सोडावीत.

५. एचएएनपीव्ही २५० अळ्यांचा अर्क आणि टीपॉल यांचे मिश्रण एक आठवड्याच्या अंतराने फवारावे.

६. शेंगा पोखरणारी अळीचा प्रादुर्भाव तीव्रता समजण्यासाठी प्रति हेक्टर ५ कामगंध सापळे पिकांच्या १ ते २ फुट उंचीवर लावावेत.

७. रासायनिक किटकनाशकाची तुरीला कळ्या लागतात १० ते १५ दिवसांच्या आंतराने आलटून पालटून १ ते २ फवारण्या केल्यास किडीपासून चांगले संरक्षण होऊन अधिक उत्पादन मिळते.

८. शेंगा पोखरण्या अळीची संख्या आर्थिक नुकसानीची पातळी ओलांडल्यास इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टक्के ३ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून साध्या पंपाने फवारावे.

जैविक नियंत्रण पध्दती : पिकाच्या उपद्रवकारक किडींचे परोपजीवी कीड/विषाणुद्वारे नियंत्रण करावे. या पध्दतीमध्ये परोपजीवी किटक अथवा सूक्ष्म जिवाणूंचा वापर करता येतो. शेंगा पोखरण्या अळीसाठी हेलिओकील (एचएनपीव्ही) हे प्रभावी असे विषाणुयुक्त जैविक किटकनाशक आहे. तुरीवरील शेंगा पोखरण्या अळीच्या नियंत्रणासाठी ५०० मि.ली. विषाणुग्रस्त अळ्यांचा अर्क प्रति हेक्टर या प्रमाणे फुलोऱ्यात/शेंगा लागताना फवारावा. या जैविक कीटकनाशकाची फवारणी सकाळी अथवा संध्याकाळी करावी म्हणजे त्याची तीव्रता कमी होणार नाही. तसेच सूर्यप्रकाशातील अपायकारक किरणांपासून बचाव होण्यासाठी एक ग्रॅम नीळ व विषाणुच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी एक अंड्याचा पांढरा बल्क १० मि.ली. जैविक किटकनाशक (एचएनपीव्ही) हेलिओकील १० लीटर पाण्यातून प्रति हेक्टर फवारावे. हे औषध अन्नद्वारे पोटात जाऊन अळीच्या शरीरावर विषाणुची वाढ होते व त्यामुळे अळ्या ५-७ दिवसात मरतात.

रोग नियंत्रण : तूर पिकावर प्रामुख्याने आढळून येणारे महत्वाचे रोग म्हणजे मर आणि वांझ होय. या रोगांच्या नियंत्रणासाठी पिकांची फेरपालट, रोग प्रतिकारक वाणांचा वापर (बी डी एन -२०१३-४९ (गोदावरी), बी डी एन-७११, बीएसएमआर ७३६, बीएसएमआर ८५३), पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाणांस २ ते २.५ ग्रॅम थायरम किंवा बाक्स्टीन चोळावे आणि रोग ग्रस्त झाडे उपटून नष्ट करावीत. तसेच ट्रायकोडर्मा १० ग्रॅम प्रति किलो बियाणास बिजप्रक्रिया केल्यास जमिनी वाटे उद्भवणाऱ्या रोगांपासून पिकाचे संरक्षण होतं.

काढणी, मळणी व साठवण : शेंगा पक्व झाल्यानंतर तुरीचे पिक कापून खळ्यावर २ ते ३ दिवस वाळवावे त्यानंतर काठीने झोडपून भूसा व दाणे अलग करावेत. त्यानंतर २ ते ३ दिवस उन्हात चांगले वाळवावे व नंतरच साठवण करावी.



बी.डी.एन. ७१६

तूर पिकाचे सुधारीत वाण :

अ.क्र.	वाधणाचे नाव	कालावधी दिवस	उत्पादन कि./हे	वैशिष्ट्ये
०१	बीडीएन -२०१३-४९(गोदावरी)	१६५-१७०	२२-२४	पांढरा दाणा,शेंगाच्या वाढीच्या अवस्थेत सिंचन देणे आवश्यक तसेच मर व वांझ रोगास प्रतिकारक.
०२	बी डी एन -७११	१५०-१५५	१६-१८	दाण्याचा रंग पांढरा कमी कालावधीत तयार होणारा तसेच मर व वांझ रोगास प्रतिकारक.
०३	बी एस एम आर ७३६	१७५-१८०	को.१४-१६ बा. १८-२०	मर व वांझ रोगास प्रतिबंधक, लाल दाणा .
०४	बी एस एम आर -८५३ (वैशाली)	१७५-१८०	को. १४-१६ बा. १८-२०	मर व वांझ रोगास प्रतिबंधक, पांढरा दाणा .
०५	बी डी एन -७१६	१६५-१७०	२० -२२	मर व वांझ रोगास प्रतिबंधक, अधिक उत्पादन क्षमता .
०६	बी डी एन-२	१५५-१६५	१४-१५	पांढरा दाणा, मररोग प्रतिकारक, गुजरात मध्ये लोकप्रिय वाण .
०७	बी डी एन -७०८ (आमोल)	१५५-१६५	१४-१७	मर व वांझ रोगास प्रतिकारक, लाल दाणा कोरडवाहूसाठी योग्य .
०८	विपुला	१४५-१६०	१४-१६	तांबड्या रंगाचा दाणा, मर व वांझ रोगास प्रतिकारक .
०९	फुले राजेश्वरी	१४०-१५०	१८-२३	मर व वांझ रोगास प्रतिकारक, लवकर पकता तांबड्या रंगाचे टपोरे दाणे .
१०	ए के टी ८८११	१५५-१६५	१५-१६	दाण्याचा रंग लाल .
११	पी के व्ही तारा	१७०-१८०	१९-२२	दाण्याचा रंग तांबडा .
१२	आयसीपीएल ८७११९	१८५-१९०	१५-१६	मर व वांझ रोगास प्रतिबंधक लाल दाणा .



वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



कापसावरील मावा कीड
आर्थिक नुसानीची पातळी : प्रत्येक झाडावर १० मावा किटक किंवा १५ ते २० % झाडावर मावाचा प्रादुर्भाव.

• कृषि माहिती वाहिनी : (02452) 229000 ई-मेल : deevnmkv@gmail.com, deemau@rediffmail.com • फोन : (02452) 228601
• विद्यापीठ संकेत स्थळ : www.vnmkv.ac.in विद्यापीठाच्या बातम्यांसाठी पहा www.promkvpbarbhani.blogspot.com f/vnmkv X/vnmkv /user/vnmkv



७

जुलै २०२४

ज्येष्ठ/आषाढ शके १९४६


र	रविवार	आषाढ शु. २ चंद्रदर्शन	शुभ दिवस	आषाढ शु. ८ दुर्गाष्टमी	शुभ दिवस	आषाढ पौर्णिमा गुरुपौर्णिमा	शुभ दिवस	आषाढ कृ. ८ कालाष्टमी	शुभ दिवस (स.१९.४७ प.)
१		७		१४		२१		२८	
सो	सोमवार	ज्येष्ठ कृ. १० कृषि दिन	आषाढ शु. ३ मुस्लिम नूतन वर्षारंभ हिजरी सन १४४६ प्रारंभ मुस्लिम मोहरम मासारंभ	आषाढ शु. ९	शुभ दिवस	आषाढ कृ. १ बाजीप्रभू देशपांडे पुण्यतिथी	शुभ दिवस	आषाढ कृ. ९	
१		८		१५		२२		२९	
मं	मंगळवार	ज्येष्ठ कृ. ११ योगिनी एकादशी	आषाढ शु. ३ विनायक चतुर्थी (अंगारक योग)	शुभ दिवस (स.७.५२ ते सायं.६.५५ प.)	आषाढ शु. १०	आषाढ कृ. २ लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती	शुभ दिवस (रात्री ८.५७ प.)	आषाढ कृ. १०	शुभ दिवस (सायं.४.४४ नं.)
२		९		१६		२३		३०	
बु	बुधवार	ज्येष्ठ कृ. १२ प्रदोष	आषाढ शु. ४	शुभ दिवस (स.७.१० प.)	आषाढ शु. ११ करिदिन देवशयनी आषाढी एकादशी पंढरपूर यात्रा चातुर्मास्यारंभ मोहस (ताजिया)	आषाढ कृ. ३/४ संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय ९.२३	शुभ दिवस	आषाढ कृ. ११ कामिका एकादशी	शुभ दिवस
३		१०		१७		२४		३१	
गु	गुरुवार	ज्येष्ठ कृ. १३/१४ शिवरात्री	आषाढ शु. ५ विश्वजनसंख्या दिन	शुभ दिवस	आषाढ शु. १२ अण्णाभाऊ साठे स्मृतिदिन	आषाढ कृ. ५	शुभ दिवस (सायं.४.१६ नं.)		
४		११		१८		२५			
शु	शुक्रवार	ज्येष्ठ अमावास्या दर्श अमावास्या	आषाढ शु. ६	शुभ दिवस	आषाढ शु. १३ प्रदोष	आषाढ कृ. ६	शुभ दिवस		
५		१२		१९		२६			
श	शनिवार	आषाढ शु. १ आषाढ मासारंभ महाकवी कालिदास दिन श्री टेंबेस्वामी पुण्यतिथी	आषाढ शु. ७	शुभ दिवस (दु.३.०४ प.)	आषाढ शु. १४ साईबाबा उत्सव प्रारंभ-शिर्डी	आषाढ कृ. ७	शुभ दिवस (स.१०.२२ नं.)		
६		१३		२०		२७			

या महिन्यातील करावयाची कामे


- सोयाबीन, मुग व उडीद पिकांची पेरणी रुंद सरी बरंबा पद्धतीने करावी.
- बागायती कापसास उर्वरीत नत्र खताची मात्रा द्यावी. कापसावरील किडींचा बंदोबस्त करावा. पावसाचा ताण २० दिवसांपेक्षा जास्त पडल्यास पाणी द्यावे.
- खरीप ज्वारी, मूग, उडीद व भुईमूग या पिकांची पेरणी जास्तीत जास्त ७ जुलैपूर्वी तर ज्वारी, सोयाबीन, कापूस, पेरसाळ व बाजरी या पिकांची पेरणी १५ जुलैपूर्वी संपवावी.
- बुरशीनाशकांची बीजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी.
- वेळेवर पेरणी झालेल्या संकरित कापूस पिकास पेरणीनंतर ३० दिवसांनी शिफारशीनुसार ४० कि./हे. नत्र खताची मात्रा द्यावी.
- संकरित ज्वारी, बाजरी व बागायती तसेच कोरडवाहू पेरसाळीस शिफारशीनुसार नत्र खताची मात्रा द्यावी.
- निंदणी व कोळपणी करून तणाचे नियंत्रण करावे.
- कापसावरील रस शोषण करणाऱ्या किडीच्या नियंत्रणासाठी आंतरप्रवाही किटकनाशकाची फवारणी करावी.
- संत्रा, मोसंबी व लिंबाची फळे ज्वारीच्या आकाराची झाल्यानंतर प्रत्येक झाडास ५०० ग्रॅम नत्र द्यावे.
- जूनमध्ये लावलेल्या केळीस युरियाची मात्रा द्यावी.
- भेंडी, गवार, चवळी व भाजी पिकाची लागवड करावी.
- आंब्याचे जागेवर मृदकाष्ठ कलम करावे.
- बोरीचे कलमीकरण करावे.



तुर : बी.डी.एन.२०१३-४१ (गोदावरी)



सायाबीन : एम.ए.यु.एस.६१२



कापूस : एन.एच.१९०१ बी.टी.



कृषि महाविद्यालय, बदनापूर

* स्थापना : सन २००० * दूरध्वनी : ०२४८९-२६१०३४

महत्वाच्या नोंदी

खरीप हंगामातील पिकावरील कीडींचे एकात्मिक व्यवस्थापन

जुलै २०२४

डॉ. पुरुषोत्तम नेहरकर डॉ. राजरतन खंदारे डॉ. अनंत लाड
विभाग प्रमुख संशोधन सहयोगी सहाय्यक प्राध्यापक
(मो.नं. ९८२२९३६९६) (मो.नं. ८२७५६०३००९) (मो.नं. ७५८८०८२०२४)

कृषि कीटकशास्त्र विभाग, वनामकृति, परभणी.

कापूस :

प्रमुख कीडी :

रस शोषण करणाऱ्या कीडी : तुडतुडे, फुलकिडे, पांढरी माशी, मावा, पिठ्या

देकून.

बोंडअळ्या : गुलाबी बोंडअळी, ठिपक्याची बोंडअळी, अमेरिकन बोंडअळी.

एकात्मिक व्यवस्थापन :

मशागतीय पद्धती :

- कपाशीची धसकट, पालापाचोळा जमा करून कंपोष्ट खड्यात टाकावा.
- उन्हाळ्यामध्ये जमिनीची खोल नांगरट करावी.
- शेताच्या कडेने तसेच पडीक जमिनीतील किडींच्या पर्यायी वनस्पती नष्ट कराव्यात.
- जास्तीच्या नत्र खताचा वापर टाळावा.
- अंतरमशागत करून पिक दोन महिने तणविरहीत ठेवावे.
- कपाशीवरील कीडींच्या नैसर्गिक शत्रू कीटकांचे संवर्धन होण्यासाठी चवळी, मुग, उडीद यासारखी आंतरपिके घ्यावीत.
- शेतामध्ये कपाशी भोवती झेंडू व एंटी या सापळा पिकाची एक ओळ लावावी.
- कपाशीची फरदड घेण्याचा मोह टाळावा.

यांत्रिक पद्धती :

- प्रादुर्भावग्रस्त गळालेली पाते व बोंडे जमा करून नष्ट करावी.
- पांढऱ्या माशांना आकर्षित करण्यासाठी पिवळे चिकट सापळे १० ते १२ प्रति हेक्टर शेतामध्ये लावावेत.
- गुलाबी बोंडअळीग्रस्त डोमकळ्या दिसल्यास त्या तोडून आतील अंड्यासह नष्ट कराव्यात.
- कामगंध सापळे ४ ते ५ प्रति हेक्टर लावावे.
- कपाशीच्या शेतामध्ये पक्षांना बसण्यासाठी हेक्टर किमान २५ पक्षीयांचे उभे करावेत. म्हणजे पक्षी त्यावर बसून शेतातील अळ्या टिपून खातील.

जैविक पद्धती :

- रस शोषक किडींना खाणारा ढालकीडा व क्रायसोपा या मित्र किटकाचे ग्रीड व अळ्या दिसून आल्यास त्यांचे संवर्धन करावे व कीटकनाशकांची फवारणी टाळावी
- पिठ्या देकणासाठी व्हर्टीसीलीयम लिक्नेनी या बुरशीची ४ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
- शेंदरी बोंडअळीसाठी ट्रायकोग्रामा बॅक्टी या परोपजीवी कीटकाच्या अंड्याचे कार्ड (१.५ लाख अंडी/हे.) फुलोरा व बोंडअवस्थेत पिकावर लावावेत.
- ५ टक्के निंबोळी अर्काची अथवा अँझाडीरॅक्टीन १०००० पीपीएम १ मिली प्रति लिटर किंवा १५०० पीपीएम २.५ मिली प्रति लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.

आर्थिक नुकसान पातळी :

मावा : १५ ते २० टक्के प्रादुर्भावग्रस्त झाडे किंवा १० मावा / पान

फुलकीडे : १० फुलकीडे / पान

पांढरीमाशी : ८ ते १० ग्रीडमाश्या / पान

तुडतुडे : २ ते ३ पिठ्ठे / पान

ठिपक्याची बोंडअळी : ५ ते १० टक्के कळ्या, फुले, बोंडाचे नुकसान

अमेरिकन बोंडअळी : १ अळी/झाड किंवा ८ – १० पतंग/सापळा सलग ३ दिवस

गुलाबी बोंडअळी : ५ ते १० टक्के कळ्या, फुले, बोंडाचे नुकसान किंवा ८ ते १० पतंग / सापळा सलग ३ दिवस

रासायनिक पद्धती :

किडी	कीटकनाशके	मात्रा/१० लि. पाणी
रसशोषक किडी	फ्लोनीकॅमीड ५०% डब्ल्यूजी किंवा	३ ग्रॅम
	फिप्रोनील ५% एससी किंवा	३० मिली
	बुप्रोफेजीन २५% एससी किंवा	२० मिली
	थायमिथोक्झाम १२.६% डब्ल्यूजी किंवा	२ ग्रॅम
	अँसीफेट ५०% + इमिडाक्लोप्रिड १.८% एसपी किंवा	२० ग्रॅम
बोंडअळी (ठिपक्याची)	क्लोरोपायरीफॉस ५०% + सायपरमेथ्रीन ५% ईसी	२० मिली
	प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी किंवा	३० मिली
	थायोडीकार्ब ७५% डब्ल्यूपी किंवा	२० ग्रॅम
	इमामेक्टीन बेंझोएट ५% एसजी किंवा	४ ग्रॅम
	थायमिथोक्झाम १२.६% + लॅमडासहॅल्लोथ्रीन १.५% झेडसी किंवा	४ मिली
अमेरिकन बोंडअळी, गुलाबी बोंडअळी	क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल १.३% + लॅमडासहॅल्लोथ्रीन ४.६% झेडसी किंवा	५ मिली
	पावरीप्रोक्सिफेन ५% + फेनप्रोपाथ्रिन १५% ईसी किंवा	१० मिली
	प्रोफेनोफॉस ४०% + सायपरमेथ्रिन ४% ईसी	२० मिली

पायरेथ्रॉईड गटातील कीटकनाशकाची फवारणी नोव्हेंबर महिन्याआगोदर सुरू करू नये यामुळे पांढऱ्या माशीचा उद्रेक होऊ शकतो.

सोयाबिन :

प्रमुख कीडी : चक्रीभुंगा, खोडमाशी, तंबाखुवरील पाने खाणारी अळी, उंटअळी,

घाटेअळी, पाने पोखरणारी अळी,

एकात्मिक व्यवस्थापन

मशागतीय पद्धती :

- सोयाबिनची पेरणी करण्यापूर्वी शेतात उन्हाळी नांगरट करावी.
- मुख्य पिकाभोवती एंटी आणि सूर्यफुल या सापळा पिकाची एक ओळ लावावी व त्यावरील तंबाखू वरील पाने खाणारी अळी आणि केसाळअळी यांची प्रादुर्भावग्रस्त पाने अळ्यासह नष्ट करावीत.

- पेरणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवडयापर्यंत संपवावी. ज्या भागातमध्ये चक्रीभुंगाच्या प्रादुर्भाव नियमित मोठ्या प्रमाणात होतो तेथे पेरणी जून अखेर पर्यंत करावी.
- पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत पिक तणमुक्त ठेवावे.
- पिकांची फेरपालट करावी, सोयाबिन पिकानंतर भुईमूगाचे पिक घेऊ नये.

यांत्रिकी पद्धती :

- शेतात सुरुवातीपासून कीडग्रस्त झाडे दिसताच उपटून नष्ट करावीत.
- हिवाळी घाटेअळी व तंबाखूची पाने खाणारी अळी या कीडींच्या सर्वेक्षणासाठी हेक्टर ५ कामगंध सापळे शेतात लावावेत.
- तंबाखूची पाने खाणारी अळी व केसाळ अळ्या एकाच पानावर पुंजक्याने अंडी घालतात व त्यातून बाहेर पडलेल्या अळ्या सुरुवातीला एकाच पानावर बहुसंख्य असतात अशी अंडी व अळीग्रस्त पाने तोडून कीडीसह नष्ट करावी.

जैविक पद्धती :

- ५ टक्के निंबोळी अर्काची ५० मिली १० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.
- तंबाखूवरील पाने खाणारी अळीच्या व्यवस्थापनासाठी एस. एल. एन. पी. व्ही. ५०० एलई विषाणू २ मिली किंवा नोमोरिया रिलाई या जैविक बुरशीची ४ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी प्रादुर्भाव दिसून येताच करावी.

आर्थिक नुकसान पातळी :

खोडमाशी : १० ते १५ % प्रादुर्भावग्रस्त झाडे.

चक्री भुंगा : ३ ते ५ प्रादुर्भावग्रस्त झाडे / मिटर ओळीत.

तंबाखुवरील पाने खाणारी अळी : १० अळ्या /मिटर ओळीत पिक फुलोऱ्यावर येण्यापूर्वी.

उंटअळ्या : ४ अळ्या / मिटर ओळीत पिक फुलोऱ्यावर असताना ३ अळ्या / मिटर ओळीत पिक शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत.

घाटे अळी : ५ अळ्या / मिटर ओळीत पिक शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत.

रासायनिक पद्धती :

किडी	कीटकनाशके	प्रमाण/१०लि. पाणी
पाने खाणाऱ्या अळ्या (तंबाखुवरील पाने खाणारी अळी, उंटअळी, घाटे अळी, पाने पोखरणारी अळी)	प्रोफेनोफॉस ५०% ईसी किंवा	२० मिली
	फ्लुबेंडामाईड ३९.३५% एससी किंवा	२.५ मिली
	क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल १८.५% एससी किंवा	३ मिली
	थायमिथोक्झाम १२.६%+लॅमडासहॅल्लोथ्रीन १.५% झेडसी	२.५ मिली
	क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल १८.५% एससी किंवा	३ मिली
चक्रीभुंगा, खोडमाशी	थायमिथोक्झाम १२.६%+लॅमडासहॅल्लोथ्रीन १.५% झेडसी किंवा	२.५ मिली
	क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल १.३%+लॅमडासहॅल्लोथ्रीन ४.६% झेडसी किंवा	४ मिली
	ईथीअर्न ५०% ईसी	३० मिली

मुग व उडिद :

प्रमुख कीडी : शेंगा पोखरणारी अळी, पाने खाणारी सोट अळी, मावा

एकात्मिक व्यवस्थापन :

- उन्हाळ्यामध्ये जमिनीची खोल नांगरट करावी.
- मोठ्या अळ्या हाताने वेचून नष्ट कराव्यात.
- ५ टक्के निंबोळी अर्काची ५० मिली १० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.

किडी	कीटकनाशके	प्रमाण /१० लि. पाणी
शेंगा पोखणारी अळी, पाने खाणारी अळी	क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल १८.५% एससी किंवा	२ मिली
	फ्लुबेंडामाईड ३९.३५% एससी किंवा	२ मिली
	थायोडीकार्ब ७५% डब्ल्यूपी किंवा	१५ ग्रॅम
	नोव्हाल्युरोन ५.२५% अधिक इंडोक्झाकार्ब ४.५०% एससी	१६.५ मिली

मका :

प्रमुख कीडी : नवीन लष्करी अळी

एकात्मिक व्यवस्थापन

मशागतीय पद्धती :

- मागील हंगामातील पिकांच्या अवशेषाची विल्हेवाट लावावी.
- जमिनीची खोल नांगरट करावी.
- पेरणी पूर्व २०० किलो प्रति एकरी निंबोळी पेंडीचा वापर करावा.
- एकाच वेळी मका पिकाची पेरणी करावी, टय्या टय्याने पेरणी टाळावी.
- सरी-वरव्यावर मका पिकाची पेरणी करावी.
- मक्यामध्ये मूग किंवा उडीद यांचे आंतरपिक घ्यावे.
- पिकाची फेरपालट करावी वारंवार एकाच शेतात मका पीक घेण्याचे टाळावे.
- मका पिका भोवती नेपियर गवताच्या ३ ते ४ ओळी लावावे. हे गवत सापळा पीक म्हणून कार्य करते.
- मित्र कीटकांना आकर्षित करण्यासाठी शेताच्या बांधावर झेंडू, कोथिंबीर, सूर्यफुल व तीळ या पिकांची लागवड करावी.
- रासायनिक खताचा अतिरेकी वापर टाळावा.

भौतिक पद्धती :

पिक ३० दिवसांपर्यंतचे असल्यास बारीक वाळू व चुन्याचे ९:१ प्रमाण करून पोंयात टाकावे.

यांत्रिक पद्धती :

अंडीपुंज, समुहातील लहान अळ्या व मोठ्या अळ्या हाताने वेचून रॉकेल मिश्रीत पाण्यात टाकून नष्ट कराव्यात. सामुहीकरीत्या मोठ्या प्रमाणात नर पतंग आकर्षित करण्यासाठी १५ कामगंध सापळे प्रति एकरी लावावेत.

जैविक पद्धती :

- ट्रायकोग्रामा प्रीटीओसम किंवा टिलेनोमस रेमस यांची परोपजीवीग्रस्त ५०,००० अंडी प्रति एकर एक आठवडयाच्या अंतराने ३ वेळा किंवा कामगंध सापळ्यामध्ये ३ पतंग / सापळा आढळून आल्यास शेतात सोडावे.
- रोपअवस्था ते सुरुवातीची पोंयाची अवस्था या कालावधीत ५ टक्के प्रादुर्भावग्रस्त झाडे आणि शेवटी १० टक्के प्रादुर्भावग्रस्त कणसे आढळून आल्यास उपयुक्त बुरशी व जिवाणूजन्य कीटकनाशकाची फवारणी करावी.

सूक्ष्मजीवजन्य कीटकनाशक	मात्रा/१० लि. पाणी
मेटा-हायजीयम अँनीसोप्लॅ	५० ग्रॅम
नोमोरीया रिलाई	५० ग्रॅम
बॅसीलस थुरींग्जेन्सिस कुर्स्टाकी प्रजाती	२० ग्रॅम

वरील जैविक कीटकनाशके पिक १५ ते २५ दिवसाचे झाल्यास पोंयामध्ये द्रावण जाईल अशा प्रकारे फवारणी करावी.

पिकाची अवस्था व कालावधी	आर्थिक नुकसानीची पातळी
रोपावस्था ते सुरुवातीची पोंयाची अवस्था (उगवणीनंतर ३ ते ४ आठवडे)	५% प्रादुर्भावग्रस्त झाडे
मध्यम पोंयाची अवस्था (५ ते ६ आठवडे)	१०% प्रादुर्भावग्रस्त झाडे
शेवटची पोंयाची अवस्था (७ आठवडे)	२०% प्रादुर्भावग्रस्त झाडे
तुऱ्याची अवस्था व त्यानंतर (८ आठवड्यांनंतर)	फवारणी टाळावी. पण १०% प्रादुर्भावग्रस्त कणसे असल्यास फवारणी करावी.

रासायनिक पद्धती :

बीजप्रक्रिया :

स्यानट्रानिलीप्रोल १९.८% + थायमिथोक्झाम १९.८% या मिश्र कीटकनाशकाची ४ मिली प्रति किलो बियाणे याप्रमाणे बीजप्रक्रिया करावी.

कालावधी	प्रादुर्भावाची पातळी	कीटकनाशके	मात्रा / १० लि. पाणी
रोपअवस्था ते सुरुवातीची पोंयाची अवस्था	५ टक्के प्रादुर्भावग्रस्त झाडे	निंबोळी अर्क किंवा अँझाडीरॅक्टीन १५०० पीपीएम	५० मिली २५ मिली
मध्यम ते शेवटची पोंयाची अवस्था	१० ते २० टक्के प्रादुर्भावग्रस्त झाडे	इमामेक्टीन बेंझोएट ५% डब्ल्यूअजी किंवा क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल १८.५% एससी किंवा थायमिथोक्झाम १२.६% +लॅमडासहॅल्लोथ्रीन १.५% झेडसी	४ ग्रॅम ४ मिली ५ मिली

ज्वारी :

प्रमुख कीडी : खोडमाशी, खोडकीडा, मावा, मिजमाशी

एकात्मिक व्यवस्थापन :

- जमिनीची खोल नांगरट व कुळवणी करून काडी, कचरा, धसकटे वेचून शेत साफ ठेवावे.
- ज्वारीची कापणी झाल्यावर धसकटे गोळा करून नष्ट करावीत.
- शिवारातील सर्व शेतकऱ्यांनी शक्यतो एकाच वेळी पक्व होणाऱ्या वाणांची निवड करून एकाच वेळी आठवडयाच्या आत पेरणी केल्यास मिजमाशी पासून संरक्षण होते.
- थायमिथोक्झाम ३०% एफएस किंवा इमिडाक्लोप्रिड ७०% डब्लुएस १० मिली प्रति किलो बियाणे याप्रमाणे बीजप्रक्रिया करावी.


आर्थिक नुकसान पातळी :

खोडमाशी : १ अंडी / झाड किंवा १० टक्के झाडाची पोंगेमर


खोडकीडा : १० टक्के प्रादुर्भावग्रस्त झाड

कीडी	कीटकनाशके	प्रमाण / १० लि. पाणी
खोडमाशी व खोडकीडा	क्लोनालफॉस २५% ईसी	३० मिली
मावा व मिजमाशी	डायमिथोएट ३०% ईसी	१० मिली

नोट : वरील सर्व कीटकनाशकाचे प्रमाण साध्या पंपासाठी आहे पेट्रोल पंपासाठी हे प्रमाण तीन पट वापरावे. शेतात कीटकनाशकाचे द्रावण करताना व फवारणी करताना चप्पा, हातमोजे व तोंडावर मास्कचा वापर करावा.



* * * * *



महिलांचे शेती कामातील श्रम व शक्ती वाचविण्यासाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान

ऑगस्ट २०२४

डॉ. जयश्री रोडगे

वरीष्ठ संशोधिका

मो. : ९५९४००५८४०

अ.भा.स.सं.प्र.कृ.म.गृह विज्ञान महाविद्यालय, वनामकृति, परभणी

कापूस वेचणी कोट

कापूस वेचणी कोट हा पांढऱ्या रंगाच्या मांजरपाट किंवा चिकणी कापडापासून तयार केला जातो. या कोटाला मनगटापर्यंत लांब बाह्या दिलेल्या आहेत, ज्यामुळे उन्हापासून तसेच कुरकुर्या/पन्हाट्या टोचण्यापासून व ओरखडे पडण्यापासून त्वचेला संरक्षण मिळते. वेचलेला कापूस साठवण्यासाठी या कोटाच्या समोरील बाजूस एक पिशवी दिली आहे पिशवी कापसाने पूर्ण भरल्यानंतर बंद उघडून कापूस सहज खाली ओतता येतो. पिशवीमध्ये पाच ते सहा किलो कापूस सहज गोळा करता येतो. कापूस साठवण्याची पिशवी कोटास शिवलेली असल्यामुळे ती कापसाच्या ओझ्याने पायात येत नाही व चालताना त्रास होत नाही. कोट अंगात घातल्यानंतर या कोटाच्या मागच्या बाजूला बटन ऐवजी अँग्रेजि सारखे बंद दिलेले आहेत त्यामुळे कोणत्याही शरीरपथीच्या म्हणजेच जाड किंवा सडपातळ शेतकरी महिलेला हा कोट अंगात व्यवस्थित घालता येतो.



कापूस वेचणी कोट

सुलभा बॅग

खत पेरणी कार्यासाठी सुलभा बॅग तयार केली आहे. ही बॅग टारपोलीनची बनवलेली आहे. या बॅगला वरील तोंडाच्या बाजूने जाड तार बसवलेली आहे त्यामुळे खत फेकण्यासाठी हात बॅग मध्ये घालताना घासत नाही आणि हाताला इजा होत नाही. बॅग कमरेला बांधलेली असल्यामुळे पायात येत नाही आणि चालताना अडथळा होत नाही दोन्ही हात मोकळे राहत असल्यामुळे काम जलद गतीने होते त्यामुळे वेळ आणि श्रम दोन्ही कमी लागतात.



सुलभा बॅग

त्रिशूल विळा

खुरपणी या कार्यासाठी त्रिशूल विळा विकसित केला आहे या विळ्याला दोन पाती आहेत आणि लांब दांडा आहे. दोन पात्यांमुळे दोन लाईन मधील गवत उभे राहून खुरपता येते, शरीराची संस्थिती योग्य राहते, गुडघे, कंबर आणि मान दुखत नाही, काम जलद गतीने होत असल्यामुळे वेळ आणि श्रम कमी लागतात.



त्रिशूल विळा

सोयाबीन काढण्यासाठी हातमोजे

सोयाबीन काढण्यासाठी हातमोजांचा संच विकसित केला आहे. या हात मोजाला लांब बाह्या आहेत व दोन बेल्ट आहेत एक दांडाला बांधता येतो व एक मनगटाला बांधता येतो, म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीस हा मोजा व्यवस्थित बसतो. मोजा हा जीन्सच्या कपड्याचा बनवलेला आहे. याला आत अस्तर आहे ते देखील जीन्सच्या कपड्याचे आहे जीन्सचा कपडा जाड असल्यामुळे वाळलेल्या शेंगा टोचून त्याचा त्रास होत नाही. हात मोजा धुण्यासाठी सुद्धा व शिवण्यास पण सोपा आहे. जुन्या जीन्सच्या पॅन्ट पासून सुद्धा हे शिवता येतात.



सोयाबीन काढण्यासाठी हातमोजे

वांगी आणि भेंडी काढण्यासाठी हातमोजे

वांगी आणि भेंडी काढण्यासाठी हातमोजे विकसित केले आहेत. हे मोजे दिसायला सोयाबीन मोजांप्रमाणेच आहेत परंतु त्यात थोडे बदल केलेले आहेत. वांगी मोजाला आतून मनगटापर्यंत दोन अस्तरे लावलेली आहेत एक अस्तर जीन्सच्या कपड्याचे व दुसरे सुती कपड्याचे आहे त्यामुळे वांग्याचे काटे आतपर्यंत जाऊन टोचू शकत नाहीत. भेंडी मोज्याला सुद्धा मनगटापर्यंत दोन अस्तरे आहेत एक अस्तर प्लास्टिकचे व दुसरे सुती कपड्याचे आहे. प्लास्टिकचे अस्तर अशासाठी आहे की भेंडीची काढणी करताना चिकट

पदार्थ निघतो त्यामुळे हातांना त्यापासून जखमा होऊन रक्त देखील निघते, आग होते. हा चिकट पदार्थ हातांना लागू नये म्हणून प्लास्टिकचे अस्तर लावले आहे. या सर्व मोजांमुळे महिलांना त्रास होत नाही त्यामुळे काम जलद गतीने होते व श्रम देखील कमी पडतात.



वांगी हातमोजे

भेंडी हातमोजे

हळद पिकाच्या लागवडीसाठी विकसित तंत्रज्ञान उकरी व नखाळ्या

उकरीला लाकडी मूठ बसवलेली असते व समोर लोखंडी खोलगट लांब पाते असते या पात्यामुळे खड्डा करता येतो लाकडी मूठ असल्यामुळे हाताला जखमा होत नाहीत. बोटांचा उपयोग उकरण्यासाठी न वापरल्यामुळे बोटांना जखमा होत नाहीत. दुसरे तंत्रज्ञान म्हणजे नखाळ्या या नखाळ्या अल्युमिनियमच्या पाईपच्या तुकड्यांपासून बनवलेल्या आहेत नखाळ्यांना पुढील बाजूने टोक आहे व या पाचही बोटांमध्ये नखांच्या बाजूला बोटांमध्ये घालतात. नखाळ्यांमुळे जमीन उकरण्यास मदत होते व बोटांना इजा होत नाही या दोन्ही तंत्रज्ञानांमुळे बोटांना इजा होत नसल्यामुळे काम जलद गतीने होते वेळ व श्रम वाचतात.



उकरी

नखाळ्या

हळद पिकाच्या कंदाभोवतीची माती उकरून कंद झाकण्यासाठी विकसित तंत्रज्ञान सावडी

यासाठी सावडी नावाचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे पारंपारिक पद्धतीमध्ये महिला शेतातच पडलेले जुने तुटलेले प्लास्टिकचे तुकडे किंवा पत्त्यांचे तुकडे घेऊन कंदाभोवतीची माती उकरून कंद झाकण्यासाठी वापरतात. परंतु विकसित केलेले सावडी हे तंत्रज्ञान म्हणजे एक जाडसर पत्रा घेऊन त्यावर लाकडी मूठ बसवलेली आहे. पत्त्यांचा उपयोग माती उकरून त्याच पत्त्यांनी मुळाभोवती माती लावता येते व धारयला लाकडी हँडल किंवा मूठ असल्यामुळे पत्रा हाताला टोचून जखमा होत नाहीत. सावडीमुळे काम जलद गतीने होते व वेळ कमी लागतो.



सावडी

लाकडी दाताळे

हळद पिकासाठी कंद उकडून वाळवणे हे कार्य इतर पिकांपेक्षा जास्तीचे आहे. जेव्हा कंद काढून स्वच्छ केले जातात. त्यानंतर त्यांना मोठमोठ्या कुकरमध्ये उकडले जातात व ताडपत्रांवर वाळवले जातात, जेव्हा ते उन्हात वाळवले जातात तेव्हा खूप गरम असतात. खालीवर करताना हातांच्या बोटांना चटके बसून फोड येतात. हा त्रास कमी व्हावा म्हणून लाकडी दाताळे तयार केले आहे. याला लाकडी दांडा बसवलेला असल्यामुळे शरीराची संस्थिती योग्य राहून आपल्याला कंद खालीवर करता येतात. वर-खाली करत असताना हातांना चटके बसत नाहीत व फोड देखील येत नाहीत. त्यामुळे श्रम व वेळ दोन्हीची बचत होते.



दाताळे

फुलेरी बॅग


फुले तोडणीसाठी बास्केट तयार केली आहे. यात सुट्टी फुले, गड्डा गुलाब तोडणीसाठी फुलेरी बास्केट तयार केली आहे. ही बास्केट पाठीवर घेता येते. फुलेरीला दोन बेल्ट बसवलेले आहेत, त्यामुळे ती स्कूल बॅग सारखी पाठीवर बांधता येते. दोन्ही हात रिकामे असल्यामुळे फुले तोडण्यासाठी दोन्ही हात वापरता येतात. बॅग प्लास्टिकची असल्यामुळे झाडाच्या फांद्या काटे अडकत नाहीत. फुलेरी बॅग धुऊन पुन्हा पुन्हा वापरता येते, त्यामुळे ती बरेच दिवस टिकते



फुलेरी बॅग

गौरी बॅग


लांब दांडीच्या फुलासाठी वेगळी बॅग आम्ही तयार केली आहे. त्या बॅगला आम्ही गौरी बॅग असे नाव दिले आहे. ही बॅग सुती ताडपत्री पासून बनवलेली आहे, त्यामुळे यात काटे अडकत नाहीत व फाटत नाही. बॅगच्या तोंडाला प्लास्टिक पाईप हा बॅगचे तोंड उघडे ठेवण्यासाठी बसवलेला आहे. त्यामुळे फुले टाकताना सोपे जाते. बॅगला कापडी हँडल बसवलेले आहे त्यामुळे बॅग रिकामी करणे सोपे जाते. बॅग धुऊन वारंवार वापरता येते. टिकाऊ असल्यामुळे अनेक वर्ष वापरता येते.



गौरी बॅग

टीकाई बॅग

गलांडा फुलासाठी जी बॅग बनवली आहे. तिला टीकाई बॅग नाव दिले आहे. ही बॅग टारपोलीनची बनवली असल्यामुळे फुलांचा ओलसरपणा कपड्याला लागत नाही. बॅग खालच्या बाजूने उघडण्याची सोय आहे त्यामुळे रिकामी करायला सोपी जाते बॅग भरल्यानंतर पायात अडकू नये व तोडलेली फुले सांडू नये म्हणून बॅग ची उंची कमी ठेवलेली आहे. ही बॅग कमरेला बांधावयाची असल्यामुळे या बॅगच्या वापरामुळे कमरेवर ताण येत नाही व महिलांच्या मांडीवर ओझे येत नाही व शेतातून चालणे सोपे जाते. झेंडूच्या फुलांसाठी देखील टीकाई बॅग योग्य आहे. ही बॅग वापरून झेंडूच्या फुलांची काढणी व्यवस्थित करता येते.



टीकाई बॅग

गोपाळ खोरे

खेड्यापाड्यांमध्ये गोदश्यामध्ये जनावरे बांधलेली असतात मोठ मोठ्या शहरांमध्ये देखील तबेल्यांमध्ये दुभती जनावरे बांधलेली असतात. या जनावरांना चरण्यासाठी सोडात येत नाही. अशा वेळेस गोदयातील शेण काढणे कठीण जाते, शेण काढताना जनावर लाथ मारू शकते. म्हणून या कार्यासाठी गोपाळ खोरे हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. गोपाळ खोऱ्याला खालच्या बाजूने जाड लाकडी पट्टी आहे. ह्या पट्टीस लोखंडी पट्टी जोडून वरच्या बाजूने लांब बांबूचा दांडा बसवलेला आहे त्यामुळे गोदयात किंवा तबेल्यात जनावरे उभी असली तरी उभे राहून जनावरांच्या खालचे शेण सहज काढता येते जनावरांनी लाथ मारण्याची भीती राहत नाही. उभे राहून शेण काढण्यामुळे शरीराची संस्थिती चांगली राहते व श्रम आणि वेळेची बचत होते



गोपाळ खोरे

दूध काढण्याची फिरती तिपाई आणि घडवंची

दूध काढणे या कामासाठी संशोधन करून तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. त्याच नाव आहे दूध काढण्याची फिरती तिपाई आणि घडवंची. दूध व्यावसायिक, महिला आणि पुरुष या सर्वांसाठीच ही फिरती तिपाई आणि घडवंची उपयोगी आहे. तिपाई आणि घडवंचीला चाके दिलेली आहेत त्यामुळे दूध काढण्याच्या व्यक्तीला बसूनच पुढे मागे होता येते व शरीराची संस्थिती नैसर्गिक ठेवता येते. घडवंची मध्ये सर्व प्रकारची भांडी ठेवता येतात त्यामुळे जनावराचे मलमूत्र भांड्याला लागत नाही व भांडी स्वच्छ राहतात. जनावराने लाथ मारली तरी घडवंची पुढे सरकते पण पुढे सांडत नाही. दूध काढताना दोन व्यक्तींची गरज भासत नाही. दूध काढताना मनावर ताण राहत नाही व हृदय गती वाढत नाही. अशा प्रकारे आपल्या अडचणी दूर होऊन आपले श्रम वाचवता येतात व होणारे नुकसान टाळता येते.



फिरती घडवंची

फिरती तिपाई



करडई हे रब्बी हंगामातील महत्वाचे तेलबिया पिक आहे. भारतामध्ये अनेक शतकांपासून रंगनिर्मिती व खाद्य तेलासाठी करडईची लागवड केली जाते. पाण्याचा ताण सहन करण्याची क्षमता व तेलामध्ये लिनोलिक आम्लाचे ७८ % प्रमाण जे मानवी शरीरातील अनिष्ट कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात ठेवते. ही करडई पिकाचे महत्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. भारत हा जगातील प्रमुख करडई उत्पादक देश आहे. महाराष्ट्रातील करडईची उत्पादकता ५७० कि./हे आहे.

करडई पिक काटेरी असल्यामुळे काढणीच्या वेळेस मनुष्य उपलब्ध नसणे तसेच मजुराची करडई काढणीबाबत उदासिनता हे करडईच्या लागवडीखालील क्षेत्र कमी होण्याचे महत्वाचे कारण आहे. यावर उपाय म्हणजे करडईची पेरणी ते काढणी पर्यंतच्या सर्व कामात यंत्रांचा जसे ट्रॅक्टर, पेरणीयंत्र, तुषार सिंचन, ट्रॅक्टर बुमस्प्रे व कंबाईन हार्वेस्टर ईत्यादींचा जास्तीत जास्त वापर करून करडईचे पिक सलग व मोठ्या क्षेत्रावर घेतल्यास करडईचे क्षेत्र व उत्पादकता वाढविण्यास मदत होईल.



करडई : परभणी कुसूम

हवामान : करडई पिकास महाराष्ट्रातील हिवाळ्यातील (रब्बी) थंड व कोरडे हवामान मानवते. जास्त पाऊस किंवा आद्रता रोगास आमंत्रण देते.

जमीन : मध्यम ते भारी, पाण्याचा योग्य निचरा असणारी जमीन लागवडीसाठी निवडावी पाण्याचा कमी निचरा असणारी जमीन लागवडीसाठी टाळावी.

वाण : परभणी-१२ (परभणी कुसूम), परभणी -४० (निमकाटेरी), परभणी-८६ (पुर्णा), शारदा, आय एस एफ-७६४, पी बी एन एस-१८४, पी बी एन एस-१५४ (परभणी सुवर्णा)



परभणी-८६ (पुर्णा),



पी बी एन एस-१८४



पी बी एन एस-१५४ (परभणी सुवर्णा)

पूर्वमशागत : खरिप पिकांची काढणी झाली की, दोन आठव्या उभ्या रोटावेटर च्या सहाय्याने पाळ्या देवून काडी कचरा वेचून घ्यावा. जमिनीला मंद/ किचतसा उतार ठेवावा म्हणजे पाण्याचा निचरा होण्यास मदत होईल. सोयाबीन काढणीनंतर कोणतीही पूर्व मशागत न करता जमिनीतील ओलीचा फायदा घेऊन पेरणी तात्काळ करावी.



पेरणी : मोठ्या व सलग क्षेत्रावर करडईची पेरणी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने खत व बी पेरणी यंत्रात आवश्यक तो बदल करून ३० आक्टोबर पर्यंत करावी यासाठी बी ५ सेंमी खोलीपर्यंत ओलाव्यात ठेवणारे पेरणीयंत्र वापरावे. **बियाणांचे प्रमाण व अंतर:** हेक्टरी १० ते १२ किलो बियाणे वापरावे पेरणीचे अंतर ४५ x २० सेंमी. ठेवावे. पेरणीपुर्वी प्रति किलो बियाणास ३ ग्रॅम कार्बेन्डीझम किंवा थायरम किंवा बावीस्टीन या बुरशीनाशकाची बीज प्रक्रिया करावी तसेच पेरणीपुर्वी बियाण्यास प्रति किलो १० मिली ट्रायकोडर्मा हरझनम या जैविक बुरशीनाशकाची बीजप्रक्रिया करावी ज्यामुळे करडई बिया व जमिनीतून उद्भवणाऱ्या रोगापासून संरक्षण होईल.

खत व्यवस्थापन : कोरडवाहू करडई पिकास प्रति हेक्टरी ४० किलो नत्र व २० किलो स्फुरद खताची मात्रा व बागायती करडई पिकास प्रति हेक्टरी ६० किलो नत्र व ४० किलो स्फुरद खताची मात्रा ट्रॅक्टरच्या पेरणी यंत्राद्वारे पेरणीसोबत घावे.

पेरणी यंत्र



विरळणी : उगवणीनंतर २० ते २५ दिवसांनी अतिरिक्त रोपे उपटून काढावीत व दोन रोपात २० सेंमी अंतर ठेवावे.

आंतरमशागत : पेरणी नंतर २५ ते ३० आणि ४५ ते ५० दिवसांनी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने कोळपण्या कराव्यात.



आंतरमशागत

पाणी व्यवस्थापन : करडई पिकास संवेदनशील अवस्थेत पाणी दिल्यास उत्पादनात दिडपट वाढ होते. यासाठी तुषार सिंचनाचा वापर करावा. त्यामुळे ४० ते ४५ टक्के पाण्याची बचत होते. कमी पाण्यात अधिक क्षेत्र सिंचित करता येते व कमी मजुराच्या सहाय्याने अधिक क्षेत्रास पाणी देता येते. तुषार सिंचन पध्दतीने पाणी देताना एका जागी दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ तुषार संच चालू ठेवू नये व पाईप निसटून पाणी साचणार नाही, याची काळजी घ्यावी.



तुषार सिंचन

करडई पिकासाठी पाण्याच्या संवेदनशील अवस्था

१) जमीनीत ओलावा कमी असल्यास उगवणीसाठी

२) पेरणीनंतर ३० ते ४० दिवसांनी

३) पेरणीनंतर ६० ते ६५ दिवसांनी

४) पेरणीनंतर ९० ते ९५ दिवसांनी

पिक संरक्षण :

आवश्यक कीटनाशकाच्या व बुरशीनाशकाच्या फवारण्या ट्रॅक्टरचलीत बूम स्प्रेद्वारे कराव्या. करडई मावा कीड नियंत्रणासाठी वेळेवर पेरणी करावी. पेरणीनंतर २५-३० दिवसांनी माव्याचा प्रादुर्भाव दिसताच डायमिथोएट ३० ईसी ७५० मिली प्रति हेक्टर ५०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. फवारणीची सुरुवात बांधाच्या कडेच्या ओळीपासून करावी.



बूम स्प्रे

काढणी व मळणी : पेरणीनंतर १३० ते १३५ दिवसांनी करडईची झाडे वाळल्यानंतर कंबाईन हार्वेस्टरने पिक काढणी करावी. कंबाईन हार्वेस्टरने कमी वेळेत अधिक क्षेत्रावरील काढणी करता येते व करडईसारख्या काटेरी पिकाची लागवड सुलभ होते.



कंबाईन

हार्वेस्टर


उपरोक्त यांत्रिकीकरणाद्वारे सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास करडईचे जिरायती मध्ये १०-१२ किंटल/हे. आणि बागायती परिस्थितीत २०-२५ किंटल/हे. उत्पादन मिळू शकते.

माहे जानेवारी २०२४ : उन्हाळी भुईमूग लागवड तंत्रज्ञान

किडी	किटकनाशके	मात्रा / १० लिटर पाणी
पाने खाणारी / पाने गुंडाळणारी आळी	किनालफॉस २५ ईसी किंवा लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ५ ईसी	२० मिली ०५ मिली
तंबाखूवरील पाने खाणारी आळी	स्पिनोसॅड ४५ एस.पी. किंवा इमामेक्टीन बेंझोएट ५ एसजी	३ मिली ३ ग्रॅम
केसाळ आळी	किनालफॉस २५ ईसी किंवा डायक्लोरव्हॉस ७६ ईसी	२० मिली १० मिली
मावा, तुडतुडे व फुलकिडे	डायमिथोएट १० ईसी किंवा	१४ मिली

१३) भुईमूग पिकावरील महत्वाचे रोग कोणते व त्याचे व्यवस्थापन कसे करावे ?

अ.क्र.	रोगाचा प्रसार	रोगाचे नाव	लक्षणे/नुकसानीचा प्रकार	उपाय योजना
१.	जमीन व बियाणे द्वारे उद्भवणारे रोग	१) खोड कुज २) मूळ कुज ३) कॉलर कुज	१) रोपांची मर होऊन हेक्टरी रोपांची संख्या घटते २) वाळू मिश्रित जमिनीमध्ये रोगांचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होतो. ३) उत्पादनात २५-४० % घट येते	१) ट्रायकोग्रामा व्हीरीडी बुरशीनाशक बीजप्रक्रिया ४.५ ग्रॅम/ किलो बियाणे किंवा २) ट्यूबॅकोनॅझॉल बुरशीनाशक बीजप्रक्रिया १.५ मी.ली./१० किलो बियाणे
२.	पानावरील रोग	१) पानावरील ठिपके (टिक्का) २) तांबेरा	पानावरील ठिपके व तांबेरा यांच्या एकत्रित प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात ६०-७०% घट येते	ट्यूबॅकोनॅझॉल २५ इ.सी. बुरशीनाशकाची फवारणी १० मी.ली./ १० ली. पाणी याप्रमाणे रोगाची लागण दिसताच करावी. १५ दिवसानंतर दुसरी फवारणी करावी.



ज्वारी हे अन्नधान्य व चारा देणारे उष्ण व समशीतोष्ण कटीबंधीय प्रदेशातील महत्वाचे पीक आहे. ज्वारी खालील क्षेत्र व उत्पादनात भारत देशामध्ये महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक लागतो. ज्वारी हे कमीत कमी निविड्यांचा वापर करून विविध हंगामात व भौगोलिक परिस्थितीत सर्व हंगामात घेता येणारे पीक आहे. कमी पावसात धान्य व कडब्याचे हमखास उत्पादन देणारे पीक असल्यामुळे महाराष्ट्रात ज्वारीची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. पावसाची अनियमितता, बदलते हवामान, वाढती लोकसंख्या, जनावरांना लागणारा चारा, जागतिक स्तरावरील इंधन समस्या या सर्व बाबींचा विचार करता ज्वारी हे बहुउपयोगी शाश्वत पीक आहे.

ज्वारीचे आरोग्यदायी फायदे:

- ज्वारीमध्ये मुबलक प्रमाणात तंतुमय पदार्थ असतात. त्यामुळे पोट साफ होण्यास मदत होते. ज्यांना एसिडिटीचा त्रास आहे त्यांनी आहारात ज्वारीचा समावेश करावा. ज्वारीच्या सेवनाने मुळव्याधीचा त्रास होत नाही.
- किडनीस्टोनचा त्रास असलेल्या व्यक्तीने आहारात ज्वारीचा समावेश केल्यास, पोषक तत्वांमुळे हा त्रास कमी होण्यास मदत होते. ज्वारीची भाकरीच नव्हे तर ज्वारीच्या इतर पदार्थांचीही आहारात समावेश करावा.
- ज्वारीमध्ये लोह तत्त्वसुद्धा मुबलक प्रमाणात असत. त्यामुळे एनिमियाचा त्रास असलेल्या व्यक्तीने आहारात ज्वारीचा भाकरीचा समावेश केल्यास त्यांना फायदा होतो.
- ज्वारीमध्ये अस्पागनाच्या निर्ऐसिनमुळे रक्तातील कॉलेस्ट्रॉलची पातळी कमी होते. तसेच ज्वारीमधील फायटो केमिकलसमुळे हृदयरोग टाळता येतात.
- ज्वारीमधल्या पोर्टेसिअम, मॅग्नेसिअम आणि मिनरल्समुळे ब्लडप्रेशर नियंत्रणात राहते. लाल पेशींची वाढ होण्यास मदत होते.

रबी ज्वारीचे उत्पादन वाढविण्याचे उपाय

- योग्य जमिनीची निवड ओलीताखालील क्षेत्र वाढविणे.
- सुधारित जातीचा वापर.
- बिजप्रक्रियाचा अवलंब व खताचा योग्य वापर.
- दोन ओळीतील अंतर ४५ सेंमी ठेवणे व प्रति हेक्टर बिब्याण्याचे योग्य प्रमाण.
- वेळेवर आंतरमशागत करणे व पीक संरक्षणाचे उपाय करणे.
- पक्षापासून पिकांचे संरक्षण करणे / चमकणाऱ्या पट्टीचा वापर करणे.

जमिनीची निवड -

मध्यम ते भारी पाण्याचा निचरा होणारी जमीन निवडावी, हलकी जमीन शक्यतो टाळावी कारण अश्या जमिनीत पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता राहत नाही मग पिकाच्या संवेदनशील काळात पाणी कमी पडते.

जमिनीची मशागत आणि ओलावा साठवण-

जेणे करून सप्टेंबरच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या आठवड्यातील पाणी जमिनीत मुविण्यास मदत होईल. पेरणीपुर्वी १५ दिवस अगोदर मुग, उडीद काढणी केलेल्या क्षेत्रामध्ये ४५ सेंमी अंतरावर बळीराम नांगराने सऱ्या करून ठेवणे जमिनीत लहान सरीरंबे/समपातळी वाफे तयार करावी. या सरीमध्ये शिफारस केलेल्या खताची पेरणी करणे आणि पेरणीच्या योग्य वेळी सरीमध्ये ज्वारी खोलवर पेरणे पण रासणी न करणे, या प्रयोगांमुळे २० ते २५ टक्के अधिक दाण्याचे उत्पादन आणि कडब्याची उत्तम प्रत मिळते.

पेरणीचा कालावधी-

- ऑक्टोबर महिन्याचा पहिला पंधरावाडा (१ ते १५ ऑक्टोबर).
- लवकर पेरणी केल्यास खोडमाशीचा उपद्रव वाढतो व उशिरा पेरणी केली तर बिब्याणाची उगवण कमी होते.

बिब्याणे व पेरणी : हेक्टर १० किलो प्रमाणित बिब्याणांची शिफारस करण्यात आली आहे.

बीजप्रक्रीया:

- काणी रोग प्रतिबंधासाठी ३०० मेश गंधक ४ ग्रॅम / कि. ग्रॅ.
- खोडमाशीचे व्यवस्थापन: थायामिथाक्झम (क्लुझर) ७० टक्के ३ ग्रॅम प्रति किलो किंवा इमीडाक्लोप्रिड ४८ टक्के एफ एस सी १४ मि. ली. प्रति किलो बिब्याणे या प्रमाणात बीज प्रक्रीया केल्यास खोडमाशीमुळे होणारी पोंगे मर कमी होऊन आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदा होतो.
- १० किलो बिब्याण्यास प्रत्येकी २५० ग्रॅम अँझोटोबॅक्टर व पीएसबी या जीवाणू संवर्धनाची प्रक्रीया करावी.

पेरणीचे अंतर :

दोन ओळीतील अंतर- ४५ सेंमी दोन ताटातील अंतर १५ सेंमी ठेवावे.

तणनाशकांचा वापर :

अँट्राझीन ५० टक्के प्रवाही १ किलो प्रति हेक्टर १ हजार लिटर पाण्यात मिसळून जमिनीवर पेरणी नंतर परंतु पिक उगवण्यापुर्वी फवारावे.

रबी ज्वारीचे सुधारीत वाण:

अ. क्र.	सुधारीत वाण	प्रसारीत	कालावधी वर्ष	दाण्याचे उत्पादन (दिवस)	कडब्याचे उत्पादन क्वि./हे.	ठळक वैशिष्ट्ये क्वि./हे.
१	परभणी सुपर मोती (एस.पी.व्ही.२४०७)	२०१९	११८-१२०	३२		११०-११५ हा वाण खोडमाशी, खोडकीड व खडखडया रोगास मध्यम सहनशील आढळून आला आहे.
२	परभणी शक्ती (पीव्हीके १००९)	२०१९	११८-१२०	२१-२५	४५-६५	खोडमाशी, खोडकीडा या कीडीस व खडखडया रोगास मध्यम प्रतिकारक्षम आढळून आला
३	परभणी मोती (एस.पी.व्ही.१४११)	२००२	१२०-१२५	१८-२०	६५-७५	टपोरे मोत्यासारखा दाणा व कडब्याची प्रत उत्तम, कोरडवाहूसाठी शिफारस
४	परभणी ज्योती (एसपीव्ही-१५९५/सीएसव्ही-१८)	२००६	१२५-१३०	३८-४०	८८-९०	उंच वाढणारा पण जमिनीवर न लोळणारा दाण्याची अणि कडब्याची प्रत उत्तम, मावा किडीस प्रतिकारक्षम, ओलीताखाली घेण्याची शिफारस.

पीकेव्ही क्रांती, फुले यशोदा, सीएसव्ही २२ आर, सीएसव्ही २९ आर, मालदांडी (एम ३५-१), फुले रेवती, फुले सुचित्रा.

रासायनिक खताचा वापर

खताची मात्रा (किलो/हे.):नत्र : स्फुरद : पालाश

कोरडवाहू : ४०:२०:००	ओलीताखाली : ८०: ४०: ४०
- कोरडवाहूसाठी ४०:२०:०० नत्र, स्फुरद, पालाश किलो / हेक्टर हि मात्रा पेरणीच्या वेळी दयावी. (१०० कि.ग्रॅ. २०:२०:० मिश्र खत व ४० कि.ग्रॅ युरियाच्या माध्यमातुन) खोल पेरून द्यावी.	ओलीताखाली सोय असल्यास ८०: ४०: ४० नत्र, स्फुरद, पालाश किलो / हे. नत्राची अर्धी मात्रा पालाश व स्फुरद पूर्ण मात्रा पेरणीच्या वेळी द्यावी व उर्वरित नत्राची अर्धी मात्रा पेरणीनंतर ३० दिवसांनी द्यावे. (१५० कि.ग्रॅ. १०:२६:२६ व ५० कि.ग्रॅ. युरियाच्या माध्यमातुन पेरणीच्या वेळी तर ८५ कि.ग्रॅ. युरिया पेरणीनंतर ३० दिवसांनी) एवढी खताची मात्रा द्यावी.

आंतरमशागत:

- रुंद पेरणी - कोळपणी सुलभ होते, आंतरमशागतीद्वारे काळ्या जमिनीला पडणाऱ्या भेगा मातीने बुजतात त्यामुळे बाष्पीभवन कमी होत.
- संद्रीय पदार्थांचे आच्छादन- मुग/उडीद/सोयाबीन चे आच्छादन केल्यास उत्पादनात वाढ होते.
- पहिली कोळपणी - पेरणी नंतर १५ ते २० दिवसांनी.
- दुसरी कोळपणी - पेरणी नंतर २५ ते ३० दिवसांनी.
- तिसरी कोळपणी - पेरणी नंतर ४० ते ५० दिवसांनी.

रबी ज्वारी पाणी व्यवस्थापन: पिकाच्या संवेदनशील अवस्थेत ज्वारीला संरक्षित पाणी द्यावे. रबी ज्वारीचे पिकास खालील अवस्थेत पाणी देणे आवश्यक

- जोमदार वाढीचा काळ : (पेरणीनंतर २५ ते ३० दिवस).
- पोटरीत येण्याचा काळ : (पेरणीनंतर ५० ते ५५ दिवस).
- फुलोऱ्यात येण्याचा काळ : (पेरणीनंतर ७० ते ७५ दिवस).
- कणसात दाणे भरण्याचा काळ : (पेरणीनंतर ९० ते ९५ दिवस).

पीक संरक्षण


लष्करी अळीचे व्यवस्थापन : कामगंध सापळे ५/एक्कर व प्रकाश सापाळ्यांचा वापर, ५ टक्के निंबोळी अर्क किंवा अझाडीरॅक्टीन १५०० पीपीएम ५ एमएल/लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी, जैविक किटकनाशक मेटॅन्हायझिम अॅनीसोप्ल ५ ग्रॅम / लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

खोडमाशीचे व्यवस्थापन : थायामिथाक्झम (क्लुझर) ७० टक्के ३ ग्रॅम प्रति किलो किंवा इमीडाक्लोप्रिड ४८ टक्के एफ एस सी १४ मि. ली. प्रति किलो बिब्याणे या प्रमाणात बीज प्रक्रीया केल्यास खोडमाशीमुळे होणारी पोंगे मर कमी होऊन आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदा होतो.



ज्वारीवरील खोड माशीचा प्रादुर्भाव झालेली पोंगेमर

मावा किडीचे व्यवस्थापन : रबी ज्वारीवरील मावा किडीच्या व्यवस्थापनेसाठी किडीचा प्रादुर्भाव दिसताच थायोमिथाक्झम २५ टक्के दाणेदार १५० ग्रॅम ५०० लिटर पाणी किंवा इमिडॅक्लोप्रिड १७.८ टक्के प्रवाही १४० ग्रॅम ५०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.



खोड किडीचे व्यवस्थापन : खोल नांगरणी केल्याने जमिनीतील खोडकीड्याचे कोष नष्ट होण्यास मदत होते. १० टक्के पेक्षा जास्त झाडाच्या पानावर छिद्रे किंवा ५ ते १० टक्के पेक्षा जास्त पोंगेमर दिसून येताच क्लोरोपायरीफॉस २५ टक्के प्रवाही, २० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

रोग व्यवस्थापन

खडखडया (चारकोल रॉट) : रोगाचे व्यवस्थापन :

१. पिकाची फेर पालट करावी म्हणजेच दरवर्षी त्याच जमिनीवर रबी ज्वारीचे पीक घेऊ नये. २. हलक्या जमिनीवर कोरडवाहू पध्दतीने पेरणी करतांना खडखडया रोगास प्रतिकारक्षम जातीचा वापर करावा. ३. पीक फुललो अवस्थेत असतांना शक्य असल्यास पाण्याची एक पाळी द्यावी. ४. खताची योग्य मात्रा देऊन सुध्दा या रोगाचा प्रादुर्भाव बऱ्याच प्रमाणात कमी करत येतो.

काणी : काणी व्यवस्थापन : १ किलो ज्वारीच्या बिब्याणास ४ ग्रॅम (३०० मेश) गंधकाची भुकटी किंवा ३ ग्रॅम थायरम बुरशीनाशकाची बिजप्रक्रीया केली असता रोगाचे नियंत्रण होते. पी. जे. ७ के, आणि पी. जे. २३ के हे रोगप्रतिबंधक वाण पेरणीसाठी वापरावेत.

काळा गोसावी : व्यवस्थापन : रोगाचा बंदोबस्त करण्यासाठी शेतातील रोगट झाडे दिसताच काळजीपूर्वक काढून घ्यावीत व प्लॅस्टिकच्या पिशवीत गोळा करावी. काळी पावडर जमिनीवर पडणार नाही ह्याची काळजी घ्यावी. ही जमा केलेली रोगट कणसे शेताबाहेर जाळून नष्ट करावी. पिकाची फेरपालट करावी. पिकाची काढणी केल्यानंतर खोल नांगरणी करावी.


कापणी व मळणी

दाणे चांगले पक्क झाले म्हणजे ज्वारीची ताटे कापून किंवा उपटून काढून घ्यावेत. कापून वा उपटून काढलेली ताटे शेतातच ३-४ दिवस वाळत ठेवतात. नंतर पेंढ्या बांधून त्या खळ्यावर रचून ठेवतात व कणसे खुडून घ्यावी खुडलेली कणसे मळणीयंत्रातून टाकून किंवा बडवून किंवा मळी करून दाणे कणसा पासून वेगळे करावे आणि ऊफणणी करून किंवा ग्रेडर च्या माध्यमातून स्वच्छ करून व्यवस्थित साठवण करावी.

* * * * *



वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



करडईतील मावा कीड

आर्थिक नुकसानीची पातळी : २७ मावा प्रती ५ से.मी. खोड किंवा सरासरी ३० % झाडांवर प्रादुर्भाव

• कृषि माहिती वाहिनी : (02452) 229000 ई-मेल : deevnmkv@gmail.com, deemau@rediffmail.com • फोन : (02452) 228601
• विद्यापीठ संकेत स्थळ : www.vnmkv.ac.in विद्यापीठाच्या बातम्यांसाठी पहा www.promkvpbarbhani.blogspot.com f/vnmkv X/vnmkv /user/vnmkv



११

नोव्हेंबर २०२४

आश्विन/कार्तिक शके १९४६

र	कार्तिक शु. २ चंद्रदर्शन माऊबीज	कार्तिक शु. ९ शुभ दिवस	कार्तिक कृ. २ लाला लजपतराय पुण्यतिथी	कार्तिक कृ. ९ शुभ दिवस (दु.१२.१६ नं.)	१
रविवार	३	१०	१७	२४	२
सो	कार्तिक शु. ३ मुस्लिम जमादिलावल मासारंभ	कार्तिक शु. १० शुभ दिवस (स.९.४० प.)	कार्तिक कृ. ३ संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय ७.४४	कार्तिक कृ. १० शुभ दिवस (स.११.३८ प.)	३
सोमवार	४	११	१८	२५	४
मं	कार्तिक शु. ४ विनायक चतुर्थी अंगारक योग	कार्तिक शु. ११ प्रबोधिनी एकादशी (सां.४.०५ नं.) संत नामदेव महाराज जयंती पंढरपूर यात्रा	कार्तिक कृ. ४ शुभ दिवस (दु.२.५५ नं.)	कार्तिक कृ. ११ उत्पत्ति एकादशी आळंदी यात्रा	५
मंगळवार	५	१२	१९	२६	६
बु	कार्तिक शु. ५	कार्तिक शु. १२ प्रदोष तुलसीविवाहारंभ	कार्तिक कृ. ५ शुभ दिवस	कार्तिक कृ. १२ शुभ दिवस	७
बुधवार	६	१३	२०	२७	८
गु	कार्तिक शु. ६ शुभ दिवस (स.११.४६ नं.)	कार्तिक शु. १३/१४ पंडित नेहरू जयंती बालदिन	कार्तिक कृ. ६ शुभ दिवस (सकाळी ६.३० ते दु.३.३४ प.)	कार्तिक कृ. १३ प्रदोष महात्मा जोतिबा फुले पुण्यतिथी संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी उत्सव आळंदी	९
गुरुवार	७	१४	२१	२८	१०
शु	आश्विन अमावास्या दर्श अमावास्या लक्ष्मीपूजन सां. ५.३५ ते रात्री ८.०६	कार्तिक शु. ७ शुभ दिवस	कार्तिक कृ. ७ शुभ दिवस (सां. ५.४८ नं.)	कार्तिक कृ. १३ शिवरात्री	११
शुक्रवार	१	८	१५	२२	१२
श	कार्तिक शु. १ कार्तिक मासारंभ बलिप्रतिपदा दीपावली पाडवा	कार्तिक शु. ८ दुर्गाष्टमी	कार्तिक कृ. ८ शुभ दिवस (सां. ७.२८ नं.)	कार्तिक कृ. १४ दर्श अमावास्या	१३
शनिवार	२	९	१६	२३	१४
				अमावास्या प्रारंभ स.१०.२९	१५
					१६
					१७
					१८
					१९
					२०
					२१
					२२
					२३
					२४
					२५
					२६
					२७
					२८
					२९
					३०

या महिन्यातील करावाची कामे

- खरीप ज्वारी व बाजरीची कापणी करून उतारारास आडवी नांगरट करावी.
- बागायती हरभऱ्यासाठी पेरणी १५ नोव्हेंबरपर्यंत करावी.
- बागायती गव्हाचे एचडी-२२७८, एचडी-२९८९ हे वाण २० नोव्हेंबर पर्यंत पेरवेत. उशीरा पेरवायच्या गव्हासाठी एचडी-२३८०, एचडी-२९८९, कैलास व पीबीएन-५१ हे वाण पेरवेत.
- गव्हास पेरणीच्या वेळी शिफारस केलेले नत्र, स्फुरद व पालाश द्यावे. (१००:५०:५०कि./हे)
- हरभऱ्यावरील घाट अळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्झोएट ५%, ४ ग्रा १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
- बागायती हरभऱ्यास व करडईस पेरणीनंतर ४५ दिवसांनी पहिले पाणी द्यावे.
- सूर्यफुलास बोंडी लागते वेळी व फुलोऱ्यात असताना ३० दिवसांनी हेक्टरी ३० किलो नत्र द्यावे.
- पूर्वहंगामी उसाची लागवड या महिन्यात संपवावी.
- टोमॅटो, फुलकोबी, पानकोबी व कांदा या भाजी पाल्याच्या रोपांची पूर्णलागवड करावी.
- तुरीवरील घाटे अळी व शेंगमाशीच्या नियंत्रणासाठी ल्युफेन्युरॉन ५.४ ई.सी. २ मिली व डायमेटोएट ३० %, १३ मिली पाण्यातून फवारावे.



पदव्युत्तर कृषि व्यवसाय
व्यवस्थापन संस्था, चाकुर

* स्थापना : सन २००९ * दूरध्वनी : (०२३८९) २५१०९३

मा.डॉ.इन्द्र मणि कुलगुरु, वनामकृषि, परभणी यांची पदव्युत्तर कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन संस्था, चाकुर येथे भेट व मार्गदर्शन

महत्वाच्या नोंदी

फळबाग लागवड नियोजन पूर्व तयारी

डॉ. जी. एम. वाघमाटे

प्रभारी अधिकारी

मो. : ७५८८५३७६९६

फळ संशोधन केंद्र, छत्रपती संभाजीनगर

फळझाडांच्या लागवडीमध्ये जागेची निवड ही अतिशय महत्वाची बाब आहे. फळबाग लागवड दीर्घ मुदतीची, जास्त गुंतवणुकीची गोष्ट असल्यामुळे सुरवातीला झालेली चुक नंतर भरून काढता येत नाही कारण फळझाडांची लागवड ही साधारणतः कायमस्वरूपी असते, त्यामुळे जागेची निवड करताना जर चुक झाली, तर कालांतराने ती दुरुस्त करणे कठीण होते म्हणून जमीन आणि हवामानाबरोबर जागेच्या निवडीबाबतीत विचार करणे गरजेचे आहे व लागवडीच्या नियोजनात जमिनीची निवड, मातीची तपासणी, फळपिकाची निवड, लागवडीचा आराखडा, जातिवंत कलमे, रोपांची निवड, पाण्याची उपलब्धता, बाजारपेठ या सर्व बाबी लक्षात घेऊन नियोजन करणे गरजेचे ठरते.

यशस्वी फलोत्पादनासाठी जमिनीची निवड : फळबागेकरिता जमीन निवडताना फक्त जमिनीचा पृष्ठभाग पाहून चालत नाही, तर त्याखालील मातीचे काळजीपूर्वक परीक्षण करणे महत्वाचे आहे. त्याकरिता लागवड करण्यापूर्वी ४-५ ठिकाणी १ ते १.५ मीटर खड्डे खोदून मातीचे परीक्षण करावे. फळझाडांसाठी दृष्टीने सर्वसाधारण फळझाडांना कमीत कमी १ मीटर खोलीनंतर मुसामा थर असणारी जमीन पाहिजे, तसेच जमिनीतील पाण्याची पातळी ३ मीटरच्या वर येणे उपयोगाचे नसते. फळझाडांकरिता गाळाच्या उत्तम निचऱ्याच्या जमिनी योग्य ठरतात.

- उत्तम निचऱ्याची ६.५ ते ७.५ च्या दरम्यान सामू असणारी जमीन निवडावी. जमिनीच्या खोलीनुसार फळपिकांची निवड करावी.
- ३० ते ४५ सेंमी खोली असणाऱ्या जमिनीत बोर, सीताफळ, काजू या फळझाडांची लागवड करावी. ७.५ सेंमीपेक्षा कमी खोलीच्या जमिनीत कोणतीही फळझाडे लावू नयेत.
- ४५ ते ९० सेंमी मध्यम खोल जमिनीत पेरू, डाळिंब, अंजीर, पपई ही फळझाडे लावावीत.
- आंबा, चिक्कू, चिंच, जांभूळ, लिंबूवर्गीय फळझाडांना एक मीटरपेक्षा जास्त खोलीच्या जमिनी लागतात, जमीन शक्यतो सपाट असावी.
- उतार २ किंवा ३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा. ज्या जमिनीचा उतार १५ टक्क्यांच्या जास्त आहे, त्या ठिकाणी टप्पे करून टिबक सिंचन पद्धत वापरून लागवड करावी.
- जमिनीचा उतार दक्षिण-पश्चिम दिशेला असल्यास फळझाडांसाठी चांगले असते, कारण अशा ठिकाणी हवा उष्ण व कोरडी राहते.
- जमीन निवडल्यानंतर जमिनीची मशागत करून घ्यावी. मातीचा प्रातिनिधिक नमुना घेऊन तपासणी करावी. त्यानुसार खतांचे नियोजन करावे.
- पूर्वमशागतीची कामे झाल्यानंतर एप्रिल - मे मध्ये फळझाडांच्या लागवड अंतराच्या शिफारशीनुसार योग्य लांबी, रुंदीचे खड्डे घेऊन हे खड्डे पोयटा माती, पालापाचोळा, शेणखत, जैविक खते, ट्रामकोडर्मा, सिंगल सुपर फॉस्फेट, शिफारशीत कीटनाशक पावडर यांच्या मिश्रणाने भरून घ्यावेत.
- फळबाग लागवडीसाठी खड्डे काढण्यापूर्वी कोणत्या लागवड पद्धतीने लागवड करावयाची आहे, यानुसार खड्डे खोदू घ्यावेत. प्रत्येक पद्धतीत दोन झाडांतील अंतर आणि दोन ओळींच्या अंतराप्रमाणे खड्डे काढावेत.
- जमिनीच्या नुस्त्या वरून दिसणाऱ्या रंगावरून निवड करू नये. प्रत्येक फळझाडांची मुळे व एकूण मुळसंभार वेगवेगळ्या प्रकारचा असतो. त्यावरून जमिनीची निवड करावी. ज्या जमिनीतून पाण्याचा उत्तम निचरा होत नाही, अशा जागेत कोणतेच फळझाड चांगले येत नाही. सर्वसाधारणपणे शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी आपण जमिनीस भारी, मध्यम व हलकी असे म्हणतो. त्यानुसार फळझाडांची निवड करावी.
- हलक्या जमिनीत पेरू, डाळिंब, कागदी लिंबू, द्राक्षे, पपई, सीताफळ, बोर, आवळा, कवठ, करवंद, चिंच, जांभूळ, फालसा, तर मध्यम जमिनीत आंबा, संत्रा, मोसंबी, चिक्कू आणि भारी उत्तम निचऱ्याच्या जमिनीत केळी हे पीक चांगले येऊ शकतात.
- जमिनीतील चुनखडीचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तेथे आंबा, पेरू, चिक्कू, संत्रा, मोसंबी, लिंबू, तत्सम फळांची लागवड करणे टाळावे.

जमिनीचा प्रकार व त्यात घ्यावयाची फळपिके	
जमिनीचा प्रकार	फळपिके
हलकी ते मध्यम	अंजीर, पेरू, डाळिंब, कागदी लिंबू, द्राक्षे, पपई, सीताफळ, बोर, करवंद, जांभूळ, कवठ, चिंच इ.
मध्यम	आंबा, चिक्कू, संत्रा, मोसंबी, काजू, नारळ इ.
भारी	केळी

जमिनीची मशागत : जागेची निवड केल्यानंतर प्रथम झाडेझुडपे तोडून स्वच्छ करावी, नंतर जमीन उभी-आडवी दोन वेळा खोल चांगली कुळबाच्या पाळीने फोडून फळी फिरवून सपाटवाळीत आणवा.

- मशागतीने जमिनीचे थर खालीवर होतात.
- जमीन समुपशीत व रवाळ होते. तसेच पावसाचे पाणी वरून वाहून न जाता ते जास्त प्रमाणात जमिनीत मुरते आणि जमिनीत ओलावा साठून राहतो.
- मशागतीमुळे तणांचा प्रादुर्भाव कमी होतो, खत चांगल्या प्रकारे जमिनीत मिसळते आणि कीटकांना व कवकीय रोगांना आळा बसतो.
- जमिनीत हवा खेळती राहून ती पिकांना राषक ठरते.
- जमिनीत रासायनिक क्रिया जास्त चांगल्या प्रकारे होऊन जमिनीतील पोषक अन्नद्रव्ये पिकाला उपलब्ध होतात.
- पिकाची उमगव आणि वाढ चांगली होऊन उत्पन्न वाढ होते.

हवामानानुसार फळपिकांची लागवड

राज्यातील शेतकरी हवामानाबाबतीत खरोखरच भाग्यवान आहेत, कारण आपल्या राज्यात सफरचंद वाळता बहुतेक फळझाडांची यशस्वी लागवड करता येते. कारण आपल्या राज्यातील हवामान फळबाग लागवडीसाठी खुपच अनुकूल आहे. यामुळे हवामानाच्या बाबतीत फळबाग लागवड करताना शेतकऱ्यांना फारसा विचार करावा लागत नाही. आपल्या राज्याचा विचार करता पश्चिम महाराष्ट्रात आंबा, केळी, चिक्कू, पपई, नारळ अशा प्रकारची फळझाडे घ्यावीत. पूर्वेकडील उष्ण व कोरड्या हवामानात संत्रा, मोसंबी, कागदी लिंबू, पेरू, द्राक्षे, डाळिंब

यासारखी फळझाडे घ्यावीत. कोकण सारख्या अति पावसाच्या भागात चिक्कू, नारळ, फणस, आंबा काजू यासारखी फळझाडे घ्यावीत. अति कमी पावसाच्या भागात बोर, सीताफळ, आवळा, चिंच अशी कोरडवाहू फळझाडे घ्यावी. हवामानानुसार फळझाडांची लागवड न केल्यास फळे न येणे, फळे लागल्यास फळांची तट खालावणे, उशिरा फळे लागणे, रोग व किडींचा प्रादुर्भाव इत्यादी समस्या भेडसावतात म्हणून हवामानानुसार फळझाड लागवड करावी.

फळबागेसाठी पाण्याची उपलब्धता : बागायती फळझाडांना नियमित पाणी द्यावे लागते, अशा बागायती फळझाडांची लागवड करताना पाण्याची उपलब्धता किती आहे, याचा विचार करूनच नियोजन करावे. कोरडवाहू फळपिकांना लागवडीच्या सुरुवातीस पहिली तीन ते चार वर्षे चांगल्या व समाधानकारक वाढीसाठी पाण्याची आवश्यकता असते. नारळ, सुपारी, केळी, पपई, चिक्कू, मसाला पिके यांना इतर फळझाडांपेक्षा जास्त पाणी लागते. तसेच फळझाडांवरील कीड व रोगांच्या नियंत्रणाकरिता आवश्यक फवारणीसाठी पाण्याची आवश्यकता असते. म्हणून पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार फळझाडांची निवड करावी. आपल्याकडे १२ महिने पाण्याची सोय असले तर ज्या फळझाडांना बाराही महिने पाणी लागते अशा फळझाडांची निवड करावी. आपल्याला पाणी आठ महिने पुरत असेल तर पेरू सारखी फळझाडे लावावीत. आपले पाणी फक्त सहा महिने पुरत असेल तर सीताफळ, रामफळ, आवळा, बोर या सारखी कोरडवाहू फळझाडांची लागवड करावी.

फळबागेचे संरक्षण : नवीन लागवड केलेल्या झाडांचे भटक्या गुरापासून संरक्षण करणे फारच गरजेचे आहे. त्याकरिता चीपार सारख्या काटेरी झाडांचे कुंपण करावे. शक्य झाल्यास काटेरी ताराचे कुंपण करावे. बागेचे उष्ण वारा, थंडीपासून संरक्षण होण्याकरिता निलगिरी, शेवरी या सारख्या चट झाडांची बागेच्या पश्चिम व दक्षिण दिशेने २-३ फुटावर लागवड करावी. काही वेळा वाऱ्याच्या अडथळ्यासाठी लावलेली झाडे बागेतील मुख्य फळझाडांबरोबर पाणी आणि अन्नद्रव्ये घेण्यासाठी स्पर्धा करतात. अडथळ्यासाठी अडथळ्यांच्या झाडांपासून १० फूट अंतरावर ३ फूट खोल व २ फूट रुंद खणून त्यामध्ये येणारी या झाडांची सर्व मुळे छादून टाकावीत. अशा प्रकारे मुळ्या छाटण्याचे काम प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यापूर्वी करावे.

फळबागेसाठी वाणांची निवड : कोल्हाटही पिकांची व्यापारी तत्वावर लागवड करावयाची झाल्यास या पिकांची उत्पादनक्षमता व प्रत उत्तम असणे आवश्यक आहे. या कारणासाठी पिकाच्या निवड माहितीची निवड महत्वाची ठरते, विविध विभागांसाठी वेगवेगळ्या जातीची शिफारस केलेली असते, महाराष्ट्र राज्यातील वातावरणात खालील फळ झाडांच्या वाण अतिशय चांगल्या प्रकारे वाढतात.

फळबागांची आखणी व अंतर

लागवडीच्या पद्धती : फळझाडांची लागवड करताना योग्य लागवड पद्धत निवडावी. कारण याच गोष्टीवर फळझाडांचे उत्पादन, रोग आणि किडींचा प्रादुर्भाव अवलंबून असतो. दोन झाडांतील अंतर शिफारशीनुसार जर ठेवले नाही, तर फळबागेतील आर्द्रता वाढते. हवा खेळती राहत नाही, रोग व किडींचा प्रादुर्भाव वाढतो.

फळझाडांची आणि जागेची निवड झाल्यावर लागवडीसाठी आखणी करणे गरजेचे आहे, तेव्हा जमिनीची आखणी करण्यापूर्वी लागवडीची पद्धत ठरवावी. फळपिके लागवडीच्या चौरस, आयताकृती, त्रिकोणी, षटकोनी, उतार (कंटूर) अशा निरनिराळ्या पद्धती आहेत. चौरस पद्धत ही सर्वात सोपी, आखणीस अडचण नसणारी आणि उष्ण-आडव्या मशागतीस योग्य अशी पद्धत प्रामुख्याने सर्वत्र वापरली जाते, आंबा, पेरू, चिक्कू, संत्रा, मोसंबी इत्यादी फळझाडांची लागवड या पद्धतीने केली जाते. या पद्धतीमध्ये झाडांच्या रांगा काटकोन करून असतात. दोन झाडांतील आणि दोन रोपांतील अंतर सारखेच ठेव असल्यामुळे झाडे सर्व दिशांनी पाहिल्यास सारख्या अंतरावर दिसतात. या पद्धतीने लागवड करणे अत्यंत सुलभ असते.

- बहुतेक ठिकाणी फळबागा चौरस पद्धतीने लावतात. या पद्धतीत दोन

फळझाड - वाणांची निवड		
फळझाड	वाण	
आंबा	केशर, हापूस, तोतापुरी, रत्ना, नीलम इ.	
संत्रा	नागपुर संत्रा, नागपूर सीडलेस इ.	
मोसंबी	काटोल गोल्ड, न्यूसेलर इ.	
कागदी लिंबू	पीडीकेव्हीलाईम, पीडीकेव्हीबहार, पीडीकेव्हीचक्रधर, साईरसबती, प्रमालिनी, विक्रम इ.	
डाळिंब	भगवा, सुपर भागवा इ.	
पेरू	सरदार (एल-४९), अलाहाबाद सफेदा, ललीत, श्वेता इ.	
चिक्कू	कालीपत्ती, क्रिकेटबॉल इ.	
बोर	काडका, उमराण, छुहारा, सोनुर-६ इ.	
आवळा	बनारसी, कृष्णा, एनए- ७, कांचन, चक्रवर्ती इ.	
चिंच	अकोलामसूती, प्रतिष्ठान, नं-२६३, अर्जिटा इ.	
सीताफळ	बालानगर, अर्कासहान, जानकी, धारूर-६, फुले पुरंदर, टी. पी-७ इ.	
जांभूळ	स्थानिक, कोकण बहाडोली इ.	
अंजीर	पुना फिम, दिनकर, फुले राजेवाडी इ.	
विविध फळझाडांच्या लागवडीचे अंतर		
फळझाड	लागवडीचे अंतर (मि.)	हेक्टरी झाडे
आंबा	१० x १०	१००
कागदी लिंबू	६ x ६	२७७
डाळिंब/अंजीर	४.५ x ३	७७०
पेरू	६ x ६	२७७
चिक्कू	१० x १०	१००
आवळा	७ x ७	२०४
चिंच	१० x १०	१००
सीताफळ	५ x ५	४००
नारळ	७.५ x ७.५	१७७

ओळीतील आणि दोन झाडांमधील अंतर सारखेच असून, ओळी काटकोनात असतात. मशागतीच्या प्रत्येक फळझाडाचा विस्तार आणि मुळ्यांची वाढ यांचा विचार करून दोन झाडांमध्ये योग्य अंतर ठेवले पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येक झाडांची योग्य वाढ होऊन फळधारणेसाठी आवश्यक तेवढा सूर्यप्रकाश आणि हवा मिळेल.

- आखणीच्या दृष्टीने सोपी व सोईस्कर पद्धत ही चौरस पद्धत असली तरी वामध्ये सुरवातीच्या काळात बरीचशी जागा निरुपयोगी राहते म्हणून काही ठिकाणी त्रिकोनी किंवा षटकोनी पद्धतीचा वापर करतात. या पद्धतीत दोन झाडांमधील अंतर सर्व बाजूने सारखे राहते, त्यामुळे सारखे हेक्टरी १५ टक्के झाडे अधिक बसतात, त्यामुळे उत्पादनाही अधिक मिळू शकते.

डोंगर उताराच्या जमिनीवर लागवड करावयाची असल्यास उताराला आडवे चर खोदून त्यावर लागवड करावी, यालाच कंटूर लागवड म्हणतात.

लागवडीच्या पद्धती निवडताना घ्यावयाची काळजी

- प्रत्येक फळझाडासाठी समान क्षेत्रफळ मिळावे.
- फळबागेतील आंतरमशागत, झाडावर फवारणी करणे आणि झाडांना पाणी देणे ही कामे सहज करता यावीत.
- बागेचे व्यवस्थापन सहज करता यावे.
- फळबागेची वाढ करण्यासाठी मोकळी जागा सोडली पाहिजे. या जागेत फळझाडांची लागवड होईपर्यंत भाजीपाला पिके व हंगामी फुलझाडांची लागवड करावी.

लागवडीचे नियोजन, खड्डे खोदणे व भरणे

जेथे फळबागेची लागवड करावयाची आहे, तेथे योग्य त्या अंतरावर चौरस किंवा त्रिकोनी पद्धतीने आखणी करून खड्डे खोदावेत. जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे आणि फळझाडांच्या प्रकारानुसार खड्ड्यांचा आकार ठरवावा. खड्डे खोदण्याचे काम उशिरात उशीरा एप्रिल महिन्यात पूर्ण करावे. खड्डा खोदताना वरच्या व खालच्या थरातील माती वेगवेगळी टाकावी. खड्डे तीन आठवडे तापू द्यावे, जेणेकरून प्रखर सूर्यप्रकाशामुळे खड्ड्याचे निर्जंतुकीकरण होईल. मे महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात खड्डे भरत राहो.

खड्डे मातीने भरताना ते निर्जंतुकीकरण करून वाळलेला पालापाचोळा १५ सें.मी. थरात भरावा. मातीमध्ये २०-२५ किलो चांगले कुजलेले शेणखत व २ ते ३ किलो गांडुलखत व २ ते ३ किलो कुडलिबोळी पेंड व २५ ग्रॅम ट्रामकोडर्मा जीवाणू मिश्रण व १५ ग्रॅम स्फुरद विरघळणारे जीवाणू व २५ ग्रॅम अझोटोबॅक्टर हे मिश्रण मिसळून घ्यावे. खड्डा जमिनीच्या वर ५ ते ७ सेंमी उंच भरून ठेवावा म्हणजे पावसाळ्याच्या सुरवातीबरोबरच लागवड करता येईल.

फळझाडासाठी खड्ड्यांचा आकार

- आंबा, संत्रा, मोसंबी, फणस, चिक्कू, पेरू, नारळ व सुपारी १० सें. मी. x १० सें. मी. x १० सें. मी.
- कागदी लिंबू ७.५ x ७.५ x ७.५ सें. मी.
- डाळिंब, काजू, बोर व अंजीर ६.० x ६.० x ६.० सें. मी.
- केळी, आवळा, सीताफळ व पपई ४.५ x ४.५ x ४.५ सें. मी.
- द्राक्ष ६.० सें. मी. खोल आणि ६.० सें. मी. रुंद सलग चर
- अननस १० सें. मी. रुंद आणि २२ ते ३० सें. मी. खोल सलग चर

फळबाग लागवडीची योग्य वेळ कोणती ?


- फळझाडांची लागवड पावसाळा सुरू झाल्यावर करणे नक्कीच फायद्याचे ठरते. पावसाळा नियमित सुरू झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत लागवड करावी. कारण या काळात जमिनीतील परिस्थिती मुळाच्या वाढीस अत्यंत पोषक असते.
- खात्रीशीर पाऊस झाल्यावर पावसाच्या सुरुवातीस जून महिना अगर जुलै महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात करावी. अतिपावसात अगर पावसाच्या शेवटी सप्टेंबर-ऑक्टोबर मध्ये फळझाड लागवड करू नये. पावसाच्या सुरुवातीस लागवड केलेली झाडे चांगली समाधानकारक वाढतात, कारण या काळात जमिनीतील परिस्थिती मुळाच्या वाढीस अत्यंत पोषक असते व ती झाडे कालावधीकरिता पाण्याचा ताणही सहन करू शकतात. जून-जुलै पर्यंत वेळेवर झाडांची लागवड झाल्यास वाढ जोमाने होते.
- थंडीच्या महिन्यामध्ये फळ झाडांची लागवड करणे टाळावे.

कलमांची निवड कशी करावी ? फळबागापासून काही वर्षांच्या मेहनतीनंतर उत्पन्न देणारे झाड न मिळाल्यास ते तोडून दुसरे लावणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. फळझाडांची कलमे, रोपांच्या निवडीवर फळांची गुणवत्ता आणि फळबागाचे एकूण यश अवलंबून असते म्हणून बागेकरिता उत्कृष्ट आणि गुणवत्ता माहित असलेली दर्जेदार आणि खात्रीशीर कलमे/रोपे आणावी. शक्यतो कृषी विद्यापीठ किंवा शासकीय रोपवाटिकेमधून रोपे आणावीत. शक्य नसल्यास आपल्या माहितीतील शासकीय पचनाधारक रोपवाटिकेतून कलमे/रोपे घ्यावीत. कलमांची निवड करताना ती किती उंच आहेत, यापेक्षा ती योग्य त्या जातीच्या मातृवृक्षापासून केलेली आहेत कि नाहीत याबाबीकडे अधिक लक्ष द्यावे. रोपे घेताना कलम बांधलेली आहेत व जोड पूर्णपणे जुळलेले आहेत याची खात्री करून घ्यावी. त्याच बरोबर ती वाढीला जोमदार आहेत, निरोगी आहेत आपणास पाहिजे त्याच जातीची आहेत याची खात्री करूनच घेतली पाहिजे.

वाहतुकीच्या दृष्टीने फळबागेचे ठिकाण : वाहतुकीच्या दृष्टीने जमिनीचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आहे. आपली बाग वाहतुकीच्या रस्त्यापासून दूर असेल तर बागेला लागणारे साहित्य जागेवर पोहोचविणे; फळे वाहतुकीच्या सोयीच्या जाग्यावर आणणे याचा खर्च वाढतो. अनेकदा शेतकरी भावेचेच्या भरात भलत्याच जागी फळबाग लावतात आणि साहित्य व फळे मजुरांच्या डोक्यावर वाहून नेण्याचा खर्च प्रचंड वाढून बागेतून फायदा काही हाती लागत नाही. त्यामुळे सुरुवातीलाच वाहतुकीच्या दृष्टीने नियोजन करणे आवश्यक आहे.

फळबाग यशस्वी करण्यासाठी महत्वाच्या गोष्टी : जमिनीची निवड, हवामानानुसार फळझाडांची लागवड, पाण्याची उपलब्धता, फळबागेची आखणी, योग्य कलमांची निवड, लागवडीची योग्य वेळ आणि लागवड केलेल्या रोपांची काळजी, या सर्व बाबी लक्षात घेऊन योग्य नियोजन केल्यास फळबाग नक्कीच फायद्याची ठरेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, व्यापक दृष्टी, उच्च ध्येय व ती प्रत्यक्ष शाकाण्यासाठी प्रयत्न अभ्यासाची पराकाष्ठा, उद्योग वृत्ती या बाबी केंद्रस्थानी ठेवल्या तर निश्चितच आपली फळबाग आदर्श ठरेल यात शंका नाही.

* * * * *



भारत हा शेती प्रधान देश असुन ५५ % देशाची लोकसंख्या उपजिविकेसाठी कृषि क्षेत्रावर अवलंबुन आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषि या क्षेत्राचा १५ % ते १६ % वाटा आहे. देशाच्या अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने कृषि हे महत्वाचे क्षेत्र आहे. अनेक उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल हा शेतीमधुनच पिकवला जातो. देशाची अर्थव्यवस्था आणि विकासदर हा शेतीच्या उत्पादकतेवर अवलंबुन आहे व याच क्षेत्रात प्रचंड रोजगाराच्या संधी भारतातील शहरी व ग्रामीण युवकांसाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतीमध्ये विविध तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी युवकांना कृषि विषयक शिक्षण आत्मसात करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरुन जमिनीची योग्य काळजी घेणे, योग्य मशागतीची पद्धत अवलंबविने तसेच नवनविन तंत्रज्ञानाचा शेती पिकात वापर करणे ज्यामुळे पिकांची व जमिनीची उत्पादन क्षमता चांगल्या प्रकारे वाढवुन शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ व सामाजिक स्थैर्य प्राप्त होईल. कृषि विज्ञान या सारख्या नव्या संकल्पना उदयास येत असताना त्यामध्ये रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत.

मला कृषि शिक्षणाची आवड :

ग्रामीण व शहरी विद्यार्थ्यांनकरीता इयत्ता दहावी नंतर कृषि शिक्षणाकरीता पदविका अभ्यासक्रम हा महाराष्ट्रातील चारही कृषि विद्यापीठांतर्गत कृषि तंत्रनिकेतनाचा दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे.

पदवी अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेशासाठी किमाण उच्च माध्यमिक म्हणजेच बारावी विज्ञान शाखेतुन उत्तीर्ण व नीट परिक्षा दिलेला विद्यार्थी गुणागुणक्रमे पात्र ठरतो. बारावी विज्ञान शाखेमध्ये पी.सी.बी विषय आवश्यक असुन गणित हा विषय नसला तरी चालतो. महाराष्ट्रातील चारही विद्यापीठात कृषिशी निगडीत बी.एस्सी (एॅग्री), बी.एस्सी (हॉर्टी), बी.एस्सी (फॉरिस्ट), बी.टेक, बी.टेक (फुड), बी.एस्सी (व्हेटनरी) इत्यादी पदवी अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार प्रवेश घेऊ शकतो.

पदव्युत्तर पदवी करीता ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावयाचे असेल त्यांना ICAR / MCAER मार्फत होणाऱ्या सीईटी व त्यांनी चार वर्ष पुर्ण केलेला बी.एस्सी (एॅग्री) किंवा समतुल्य अभ्यासक्रम मिळुन त्यांना गुणागुणक्रमे त्यांची निवड पदव्युत्तर पदवीच्या विविध शाखेत अभ्यासक्रमाकरीता होते.

पुढे आचार्य पदवी करीता विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावयाचे असल्यास त्याचे ज्या विषयात एम. एस्सी (एॅग्री) केली असेल त्या विषयाची ICAR / MCAER मार्फत होणारी सीईटी परिक्षा देऊन तसेच त्यांनी दोन वर्ष अभ्यासक्रम पुर्ण केलेल्या एम. एस्सी (एॅग्री) किंवा समतुल्य अभ्यासक्रमाच्या गुणागुणक्रमे त्याला उपलब्ध असलेल्या आचार्य पदवीच्या जागेवर त्यांची निवड होते.

कृषि शिक्षणाकरीता उपलब्ध विद्येची दारे :

कृषि शिक्षणाकरीता भारतात एकुण-६३ कृषि व कृषि संबंधीत विद्यापीठे आहेत, ३-केंद्रिय कृषि विद्यापीठ आहेत. या सर्व विद्यापीठांमधुन कृषि क्षेत्रातील शिक्षण व नवनविन तंत्रज्ञान दिले जाते.

महाराष्ट्र राज्याचा विचार केल्यास राज्यामध्ये एकुण ४ कृषि विद्यापीठे आहे. या अंतर्गत कृषि शिक्षणाचा पाया राज्यातील व राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांमध्ये रोवला जात आहे.

मराठवाडा विभागात कृषि अभ्यासक्रमाकरीता १८ मे, १९७२ रोजी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. त्यापुर्वी १९५६ साली परभणी येथे कृषि महाविद्यालयाच्या स्थापनेने सुरवात होऊन आज विद्यापीठांतर्गत १२ घटक व ४३ संलग्नक महाविद्यालये आहेत. नुकतेच नवीन चार शासन अनुदानित घटक महाविद्यालये स्थापन करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. एकुण ६ घटक व ५१ खाजगी कृषि तंत्र विद्यालये आहेत, याद्वारे विद्यार्थ्यांलना कृषि विषयक शिक्षण देण्यात येते. विद्यापीठांमध्ये कृषि, उद्यानविद्या, कृषि अभियांत्रिकी, सामुदायिक विज्ञान, अन्नतंत्रज्ञान, कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन यात दोन वर्षाचा पदव्युत्तर तर आचार्य पदवी कार्यक्रम कृषि शाखेच्या नऊ विषयात, अन्नतंत्रज्ञान शाखेत पाच विषय, कृषि अभियांत्रिकी शाखेतील चार विषयात व सामुदायिक विज्ञान शाखेत एका विषयात राबविण्यात येतो यांचे शिक्षण घेण्याची संधी ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना मिळते.

कृषि क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी

१. कृषि पदविका : इयत्ता दहावी नंतर मराठी माध्यमांतुन वनामकृवि, परभणी विद्यापीठातुन दोन वर्षाचे कृषि पदविकेचे, शिक्षण घेऊन खालील क्षेत्रांमध्ये नोकरीची संधी मिळते.

शासकीय क्षेत्र : शासकीय क्षेत्रांमध्ये राज्यशासनात कृषि विभागातर्गत कृषि सेवक, जिल्हा परिषदेत ग्रामसेवक, तसेच कृषि विद्यापीठातर्गत कृषि सहाय्यक (पदविका), प्रयोगशाळा सहाय्यक इ. पदाच्या भरतीकरीता विद्यार्थी पात्र ठरतो.

खाजगी क्षेत्र : खाजगी क्षेत्राचा विचार करता कृषि क्षेत्रात पदविकेचे शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी राज्यात कार्यरत असलेल्या विविध बियाणे, खते, किटकनाशके, ठिंबक-तुषार सिंचन इत्यादी अग्रगण्य खाजगी कंपन्यात काम करू शकतात.

स्व:उद्योग : भारत हा कृषि प्रधान देश आहे व आपला देश हा ७० % शेतीवर अवलंबुन आहे त्यामुळे कृषि पदविकेचे पायाभुत शिक्षण घेऊन तो स्व:ताच्या शेतामध्ये नवनविन उपक्रम राबवुन आपले उदरनिर्वाह करू शकतो.

२. कृषि पदवी : विद्यार्थी मित्रांनो, कृषि क्षेत्रांमध्ये पदवीधारण केल्यानंतर पुढील उच्च शिक्षणाकरिता आपल्या आवडत्या विषयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी घेण्याकरिता ICAR मार्फत होणारी विशिष्ट विषयातील CET देऊन भारतातील कुठलाही विद्यापीठात गुणागुणक्रमे प्रवेश मिळू शकतो. तसेच MCAER CET सुद्धा आवडत्या विषयामध्ये महाराष्ट्रातील चार विद्यापीठातील कुठल्याही एका विद्यापीठात पदव्युत्तर शिक्षण पुर्ण करू शकतात.

शासकीय नोकरी : केंद्र शासनामार्फत होणारी केंद्रिय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देण्यास पदवी झालेला विद्यार्थी पात्र ठरतो. केंद्रिय लोकसेवा आयोगामधील महत्त्वपूर्ण IAS, IFS, IPS, IAAS, ICAS, IPS, IRS (CIT), IPS (IT) इत्यादी या पदांवर घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यावर काम करण्याची संधी प्राप्त होते. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/ICAR अंतर्गत विविध राष्ट्रीय संशोधन केंद्रवर कृषि पदवी धारण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या पदांवर काम करण्याची संधी मिळते. राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये कृषि अधिकारी किंवा विकास अधिकारी, प्रोबेशनरी अधिकारी, क्लॉर्क या पदांवर IBPS मार्फत होणाऱ्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झाल्यास काम करण्यासाठी संधी मिळते. तसेच केंद्र/राज्य शासनांतर्गत कोणत्याही परिक्षेत कृषि पदवी/कोणत्याही शाखेतील पदवी आर्हता पुर्ण केलेला विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन केंद्र/राज्य शासनांची शासकीय नोकरी मिळवू शकतो. तसेच राष्ट्रीय केमिकल्स व फर्टीलायझर्स लिमिटेड, IFFCO, नॅशनल सीड्स लिमिटेड, नॅशनल फर्टीलायझर्स लिमिटेड, इत्यादी भारताच्या कंपन्यात विविध पदांवर काम करण्याची संधी उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांनो, राज्यशासनांतर्गत येण्यात येणारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्यामधील महत्त्वपूर्ण पदे जसे उपजिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषि उपसंचालक/उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ कृषि अधिकारी, नायब तहसीलदार, महिला व बाल विकास अधिकारी, वन अधिकारी इत्यादी पदांवर काम करण्यासाठी संधी मिळते. महाराष्ट्रातील कृषि विद्यापीठांतर्गत कृषि पदवी धारण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठातील वेळोवेळी निघणाऱ्या जाहिरातीमधून कनिष्ठ संशोधक सहाय्यक, कृषि सहाय्यक (पदवी) या पदांवर काम करण्यासाठी संधी प्राप्त होते. राज्य शासनाच्या जिल्हा परिषदेतर्गत निघणाऱ्या विस्तार अधिकारी (कृषि) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी), विस्तार अधिकारी (पंचायत), कंत्राटी ग्रामसेवक इत्यादी पदांवर काम करण्याची संधी उपलब्ध होते.

खाजगी क्षेत्र : विद्यार्थ्यांनो खाजगी क्षेत्राचा विचार केला तर कृषि पदवीधारकांना अनेक बियाणे, किटकनाशके, खते, ठिंबक-तुषार सिंचन कंपन्या, खाजगी क्षेत्रातील बँक, प्रक्रिया उद्योग, कृषि सल्ला केंद्र, विमा कंपन्यांमध्ये काम करता येते.

स्व:उद्योग : कृषि पदवी धारण केलेल्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या स्वतःच्या शेतीमध्ये नवनवीन उपक्रम घेऊन उत्पादन व उत्पादकता वाढवुन नविन बदल घडवुन आणू शकतात. दर्जदार उत्पादन करण्यासाठी पिकांचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे असते या व्यवस्थापना

दरम्यान कृषि निविद्या, सिंचन, पिकांची मशागत, कृषि अवजारे, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन अशा प्रकारच्या संलग्न व्यवसायांमध्ये अनेक सेवा संधी दडलेल्या आहेत. ग्रामीण भागात युवकांना प्राथमिक प्रक्रिया करण्याची काही यंत्रे विकत घेऊन शेतमालाची स्वच्छता, प्रतिवारी आणि पॅकींग करून शेतमाल बाजारात पाठविणे यासारखा उद्योग उभा राहू शकतो. एका विचाराचे विद्यार्थी एकत्र येऊन एक गट स्थापन करून फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्थापन करू शकतात व विविध प्रकाराचे प्रक्रिया उद्योग उदा: आवळा कॅन्डी, मसाला उद्योग, कवठ, चिकू पासुन जॅम व जैली, काजु प्रक्रिया उद्योग, मशरूम उत्पादन, कोकम प्रक्रिया उद्योग, दुध प्रक्रिया उद्योग, डाळ मिल, द्राक्षपासुन बेवना इत्यादी स्व:उद्योग करू शकतात तसेच मेक इन इंडिया मेड इन इंडियाच्या धर्तीवर आपल्या कंपन्यांचा ब्रँड तयार करून देश विदेशात निर्यात करू शकतात. त्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना कार्यरत आहे. बि-बियाणे बँक, शेती अवजारे बँक तयार करून खरीप व रब्बी हंगामांमध्ये अवजारे भाडेतत्वावर शेतकऱ्यांना देऊन शेतीची मशागत, पेरणी, आंतर मशागत, खत पेरणी, काढणी, मळणी इत्यादी करू शकतात हा एक नवा व्यवसाय उदयास येत आहे. कृषि युवक एकत्रित येऊन गट शेती उद्योगातून चांगली संधी निर्माण होऊ शकते. फळे, भाजीपाला व इतर कृषि उत्पादने एकत्रित समुहाने केल्यामुळे कमी खर्चात उत्पादनात वाढ होऊ शकते. याकरीता राज्यात गट शेतीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न चालू आहे.

३. पदव्युत्तर पदवी : पदव्युत्तर पदवी धारण केलेल्या विद्यार्थी आचार्य पदवी घेण्यासाठी पात्र ठरतो. त्यासाठी त्या विद्यार्थ्यांनी ज्या विषयांमध्ये उदा: Agricultural Extension Education, Agricultural Economics, Agronomy, Horticulture, AHDS, Plant Pathology, Entomology, Botany, Soil Science, इत्यादी विषयात पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केलेली असेल त्या विषयाची ICAR/MCAER मार्फत होणारी CET देऊन गुणागुणक्रमे पुढील आचार्य पदवी घेण्याची संधी प्राप्त होते. UGC NET किंवा ASRB NET देऊन कृषि विद्यापीठ, कृषि विज्ञान केंद्र येथे शास्त्रज्ञ म्हणुन कार्य करून शकतात. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या ICAR विविध राष्ट्रीय संशोधन केंद्रवर शास्त्रज्ञ म्हणून निवड होऊन काम करण्याची संधी प्राप्त होते. कृषि पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवीतील सर्व केंद्रे व राज्य शासनाच्या शासकीय व निमशासकीय परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध आहे. तसेच या विद्यार्थ्यांना कृषि विद्यापीठांमार्फत निघणाऱ्या वरिष्ठ संशोधक सहाय्यक या पदाच्या परीक्षेसाठी संधी प्राप्त होते. कृषि विज्ञान केंद्रांमध्ये विषय विशेषज्ञ (SMS) या पदावर काम करण्याची संधी प्राप्त होते. कृषि तंत्रनिकेतन, कृषि तंत्रविद्यालयमध्ये शिक्षक या पदावर तसेच शेती/कृषि हा विषय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये व कृषि विषयक किमान कौशल्य अभ्यासक्रम राबविण्यात येत असलेल्या कृषि महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून काम करण्याची संधी उपलब्ध होते. कृषि पदवी/पदव्युत्तर पदवीधारकांना प्रासामाध्यमांद्वारे जसे आकाशवाणी, दूरदर्शन व कृषि पत्रकारीता क्षेत्रातही करिअर घडवण्याची संधी प्राप्त होते.

खाजगी क्षेत्र :- खाजगी क्षेत्रांमध्ये कृषितील पदव्युत्तर पदवी धारकांना बि-बियाणे, खते, किटकनाशके, ठिंबक व तुषार सिंचन कंपन्या, खाजगी क्षेत्रातील बँक, प्रक्रिया उद्योग, कृषि सल्ला केंद्र, विमा कामांमध्ये उच्च पदांवर काम करण्याची संधी प्राप्त होते.

स्व:उद्योग: कृषि पदव्युत्तर धारकांना विशिष्ट विषयामधील अधिकचे ज्ञान असल्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना स्व:ताचा दुध, मसाले, दाळ, फळे, भाजीपाला, शेतमाल प्रक्रिया इत्यादी उद्योग अधिक चांगल्याप्रकारे चालविण्यास चालणा मिळते. या करीता केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना मदतीस कार्यान्वीत आहे.

४. आचार्य पदवी : देशाच्या आर्थिक प्रगतीत कृषि क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न होत आहे. कृषि विषयातील कोणत्याही एका विषयात पदव्युत्तर पदवी धारण केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्याच विषयामध्ये आचार्य पदवी घ्यावी लागते. त्या विद्यार्थ्यांना पदवी व पदव्युत्तर पदवी मधील सर्व केंद्र व राज्य शासनातील शासकीय व निमशासकीय पदांसाठी परीक्षा देण्यास पात्र ठरतो. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR मधील विविध राष्ट्रीय संशोधन केंद्र, कृषि विद्यापीठे, कृषि विज्ञान केंद्र येथे शास्त्रज्ञ, सहाय्यक प्राध्यापक, विषय विशेषज्ञ, व्याख्याता या उच्च पदांवर काम करण्याची संधी प्राप्त होते.

खाजगी क्षेत्र :- खाजगी क्षेत्रांमध्ये कृषितील आचार्य पदवी धारकांना बि-बियाणे, खते, किटकनाशके, ठिंबक व तुषार सिंचन कंपन्या, खाजगी क्षेत्रातील बँक, प्रक्रिया उद्योग, कृषि सल्ला केंद्र, विमा कंपन्यांमध्ये उच्च पदांवर काम करण्याची संधी प्राप्त होते.

स्व:उद्योग: आचार्य पदवीधारकांना विशिष्ट विषयामधील अधिकचे ज्ञान असल्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना स्व:ताचा दुध, मसाले, दाळ, फळे, भाजीपाला, शेतमाल प्रक्रिया इत्यादी उद्योग अधिक चांगल्याप्रकारे चालविण्यास चालणा मिळते. या करीता केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना मदतीस कार्यान्वीत आहे.

अ.क्र.	कृषि विद्यापीठाचे नाव	स्थापना	येणारे जिल्हे
१	वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी.	१८ मे, १९७२	परभणी, लातूर, धारशिव, नांदेड, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड.
२	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला.	२० ऑक्टोबर, १९६९	अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया
३	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा-अहमदनगर.	२९ मार्च, १९६८	अहमदनगर, जळगाव, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे
३	बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली जिल्हा-रत्नागिरी.	१८ मे, १९७२	रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर